

## **Pakkausseloste: Tietoa potilaalle**

### **Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen**

natriumkloridi

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Natriumklorid Abcur on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natriumklorid Abcur -valmistetta
3. Miten Natriumklorid Abcur -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Natriumklorid Abcur -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Natriumklorid Abcur on ja mihin sitä käytetään**

Natriumklorid Abcur -valmistetta käytetään natriumvajeen hoitoon. Natriumvajeen syynä voi olla esimerkiksi suolentypistys (avanne) tai sairaus, josta käytetään nimitystä SIADH (antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä). Natriumklorid Abcur sisältää vaikuttavana aineena natriumkloridia, joka on tärkeä elimistön nestetasapainolle.

Natriumkloridia, jota Natriumklorid Abcur sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natriumklorid Abcur -valmistetta**

**Älä käytä Natriumklorid Abcur -valmistetta**

- jos olet allerginen natriumkloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla vaikea munuaisten vajaatoiminta
- jos sinulla hoidosta huolimatta esiintyy sydämen vajaatoiminnan oireita
- jos sinulla on turvotusta
- jos sinulla vaikea maksan vajaatoiminta (maksakirroosi)
- jos sinulla on raskausmyrkytys.

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Natriumklorid Abcur -valmistetta

- jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
- jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta
- jos sinulla on verenpainetauti
- jos käytät kortisonia sisältäviä lääkkeitä.

### **Muut lääkevalmisteet ja Natriumklorid Abcur**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Natriumklorid Abcur -valmisteella voi olla vaikutusta seuraavien lääkkeiden tehoon tai ne voivat vaikuttaa tämän lääkkeen vaikutukseen:

- verenpainelääkkeet
- litiumia sisältävät lääkkeet.

### **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Riskejä ei ole tiedossa, jos valmistetta käytetään suositusten mukaisesti.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Lääkkeellä ei ole osoitettu olevan vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

## **3. Miten Natriumklorid Abcur -valmistetta käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Aikuiset: annostus on yksilöllinen, kuitenkin enintään 20 tablettia päivässä jaettuna osa-annoksiin. Tabletit on nieltävä kokonaisina.

### **Jos otat enemmän Natriumklorid Abcur -valmistetta kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet ottanut liian paljon Natriumklorid Abcur -valmistetta, sinulla voi ilmetä seuraavia oireita: jano, vähentynyt syljen erityys, kielen turpoaminen, sydämen tykytys, matala verenpaine, nestettä aivoissa tai kehossa, päänsärky, levottomuus, huimaus, mahakrampit, oksentelu ja ripuli. Vakavissa tapauksissa voi esiintyä koomaa ja hengityksen pysähtymistä.

### **Jos unohdat käyttää Natriumklorid Abcur -valmistetta**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

### **Jos lopetat Natriumklorid Abcur -valmisteen käytön**

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu (esiintymistiheys on tuntematon): pahoinvointi, oksentelu.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

## **5. Natriumklorid Abcur -valmisteen säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Exp) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Natriumklorid Abcur sisältää**

- Vaikuttava aine on natriumkloridi.
- Muut aineet ovat talkki, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, makrogoli.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoost**

Muovipurkki, jossa 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 tai 100 tablettia.

### **Myyntiluvan haltija**

Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg, Ruotsi

### **Valmistaja**

Viminco, Skælskør, Tanska

### **Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi**

29.9.2014

## **Bipacksedeln: Information till patienten**

### **Natriumklorid Abcur 500 mg, filmdragerad tablett**

natriumklorid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur
3. Hur du använder Natriumklorid Abcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för**

Natriumklorid Abcur används för att behandla natriumbrist som uppstått på grund av att du t ex har en förkortad tarm (stomi) eller lider av en sjukdom som kallas SIADH (inadekvat ADH-sekretion). Den aktiva substansen i Natriumklorid Abcur är natriumklorid, ett ämne som är viktigt för vätskebalansen i kroppen.

Natriumklorid som finns i Natriumklorid Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur**

**Använd inte Natriumklorid Abcur:**

- om du är allergisk mot natriumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har allvarligt nedsatt njurfunktion
- om du har symtom på hjärtsvikt trots behandling
- om du har vätskeansamling
- om du har allvarligt nedsatt leverfunktion (levercirros)
- om du har havandeskapsförgiftning.

#### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Abcur

- om du har hjärtsvikt
- om du har nedsatt njur-/leverfunktion
- om du har högt blodtryck
- om du använder läkemedel som innehåller kortison.

#### **Andra läkemedel och Natriumklorid Abcur**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Natriumklorid Abcur kan påverka eller påverkas av om du använder något av följande:

- blodtryckssänkande läkemedel
- läkemedel som innehåller litium.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Inga kända risker vid rekommenderad dos.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har påvisats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **3. Hur du använder Natriumklorid Abcur**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vuxna: individuell dosering, dock högst 20 tabletter per dag uppdelat på flera doseringstillfällen. Tabletterna bör sväljas hela.

### **Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Abcur**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit för mycket Natriumklorid Abcur kan du drabbas av följande: törst, minskad saliv, svullen tunga, hjärtklappning, blodtrycksfall, vätskeansamling i hjärnan eller kroppen, huvudvärk, rastlöshet, yrsel, magkramp, kräkningar och diarré. Koma och andningsstillestånd kan förekomma i allvarliga fall.

### **Om du har glömt att använda Natriumklorid Abcur**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

### **Om du slutar att använda Natriumklorid Abcur**

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Illamående, kräkningar

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

### **Finland**

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret  
PB 55  
FI-00034 Fimea

## **Sverige**

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

### **5. Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

### **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

#### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är natriumklorid.
- Övriga innehållsämnen är talk, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, makrogol.

#### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Plastburk med 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 eller 100 tabletter.

#### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg

#### **Tillverkare**

Viminco, Skælskør, Danmark

#### **Denna bipacksedel ändrades senast**

29.9.2014