

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lidocaine Accord 10 mg/ml injektioneste, liuos
Lidocaine Accord 20 mg/ml injektioneste, liuos
lidokaiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Lidocaine Accord on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lidocaine Accordia
3. Miten Lidocaine Accord otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lidocaine Accordin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lidocaine Accord on ja mihin sitä käytetään

Lidocaine Accord on paikallispuudute. Sen avulla puudutetaan kehon osia pienien leikkaustoimenpiteiden aikana. Se estää hermoja lähettämästä kipuviestejä aivoihin, etkä näin ollen tunne kipua. Sen vaikutus alkaa muutaman minuutin kuluttua pistoksesta, ja vaikutus häviää hitaasti, kun leikkaustoimenpide on ohitse.

Lidokaiinihydrokloridia, jota Lidocaine Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lidocaine Accordia

Sinulle ei saa antaa tätä lääkettä

- jos olet allerginen lidokaiinihydrokloridille, amidityyppiselle paikallispuudutteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on hyvin matala verenpaine tai jos olet menettänyt liikaa verta tai muita kehon nesteitä tai jos sydämesi ei pysty pumppaamaan tarpeeksi verta muista syistä, sinulle ei saa Lidocaine Accord -injektiota lähelle selkäydintä.

Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin näistä koskee sinua, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät

Lidocaine Accord -valmistetta

- jos olet ikääntynyt tai yleisesti heikossa kunnossa
- jos sinulla on jotain sydänvaivoja, kuten hidas tai epäsäännöllinen sydämen syke tai sydämen vajaatoiminta
- jos sinulla on keuhkosairaus tai hengitysvaikeuksia
- jos sinulla on maksasairaus tai munuaisvaivoja
- jos sinulla on epilepsia
- jos pistoskohta on tulehtunut tai infektoitunut
- jos sinulla on porfyria (harvinainen perinnöllinen sairaus, joka vaurioittaa ihoa ja hermostoa)
- jos sinulla on veren hyytymiseen liittyviä ongelmia
- jos olet viimeisellä raskauskolmanneksella.

Jos et ole varma koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Lidocaine Accord -valmisteen saamista.

Muut lääkevalmisteet ja Lidocaine Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Erityisesti kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

- muut paikallispuudutteet
- vatsa- tai pohjukaissuolihaavan hoitoon käytetyt lääkkeet (esim. simetidiini)
- rytmihäiriölääkkeet (esim. amiodaroni).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Annoksen ja antotavan mukaan Lidocaine Accord voi vaikuttaa tilapäisesti ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Kysy lääkäriltä, milloin on turvallista jatkaa näitä toimintoja.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Lidocaine Accord sisältää natriumia

Yksi millilitra injektioestettä sisältää noin 0,118 mmol natriumia (jos käytettävän valmisteen vahvuus on 10 mg/ml) tai 0,082 mmol natriumia (jos käytettävän valmisteen vahvuus on 20 mg/ml). Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

3. Miten Lidocaine Accord otetaan

Lidocaine Accord -valmisteen antaa lääkäri. Se annetaan pistoksena laskimoon, lihakseen, ihon alle tai epiduraalitalaan lähelle selkäydintä.

Lääkärin antama annos riippuu tarvitsemastasi kivunlievityksen tyypistä. Se riippuu myös koostasi, iästäsi, fyysisestä kunnostasi ja siitä kehon osasta,

johon lääke pistetään. Sinulle annetaan pienin mahdollinen annos, jolla saadaan haluttu vaikutus.

Käyttö lapsille ja nuorille

Annosta pienennetään lapsille ja potilaille, joilla on heikko yleiskunto.

Lidocaine Accord annetaan yleensä lähelle sitä kehon osaa, jossa toimenpide tehdään.

Jos saat enemmän Lidocaine Accord -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Hoitava lääkäri on koulutettu hoitamaan Lidocaine Accord -valmisteen liian suuresta määrästä johtuvia vakavia haittavaikutuksia.

Jos Lidocaine Accord -valmistetta on annettu liikaa, ensimmäisiä oireita ovat yleensä seuraavat:

- kouristuskohtaukset
- levottomuus
- huimaus tai heikotus
- pahoinvointi
- huulten tai suunympäryksen tunnottomuus tai pistely
- näköongelmat.

Jos jokin näistä koskee sinua tai arvelet saaneesi liikaa Lidocaine Accord -valmistetta, kerro siitä välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Liiallisesta Lidocaine Accord -valmisteen annosta voi seurata vakavampia haittavaikutuksia, kuten tasapaino- ja koordinaatiohäiriöt, kuulon muutokset, euforia (hyvänolontunne), sekavuus, puheongelmat, kalpeus, hikoilu, vapina, kouristuskohtaukset, sydän- ja verisuonivaikutukset, tajuttomuus, kooma ja hengityskatkos.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle välittömästi, jos saat vakavan allergisen reaktion (angioedeema tai anafylaktinen sokki). Oireita voivat olla äkillinen

- kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus, mikä voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia
- vakava tai äkillinen käsien, jalkojen tai nilkkojen turvotus
- hengitysvaikeudet
- voimakas ihon kutina (ja kohonneita patteja)
- kuume
- verenpaineen lasku.

Nämä ovat harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla 10:stä)

- matala verenpaine
- pahoinvointi

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

- ihon pistely
- huimaus
- hidas sydämen syke
- korkea verenpaine
- oksentelu

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

- kouristuskohtaukset
- kielen tunnottomuus tai suunympäryksen kihelmöinti
- korvien soiminen tai ääniherkkyys
- näköhäiriöt
- tajuttomuus
- vapina
- uneliaisuus
- heikotus
- korvien soiminen (tinnitus)
- päihtynyt olo
- puhevaikeudet

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

- yliherkkyysoireet, kuten nokkosihottuma, ihottuma, angioedeema ja vaikeissa tapauksissa anafylaktinen sokki
- tuntoaistin muutokset tai lihasheikkous (neuropatia)
- selkäydintä ympäröivän kalvon tulehdus (lukinkalvotulehdus), joka voi aiheuttaa alaselän kipua tai alaraajojen kipua, tunnottomuutta tai heikkoutta
- kaksoiskuvat
- epäsäännöllinen sydämen syke tai sen pysähtyminen
- hidastunut hengitys tai sen pysähtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Lidocaine Accord säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä lääkettä ampullin/injektiopullon tai kotelon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Vain kertakäyttöön, käytettävä välittömästi ensimmäisen avaamiskerran jälkeen, käyttämätön liuos on hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat liuoksen värjäytyneen millään tavoin. Injektionestettä ei saa käyttää, jos siinä näkyy hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lidocaine Accord sisältää

Vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.

Lidocaine Accord 10 mg/ml injektioneeste, liuos: yksi millilitra injektioneestettä sisältää 10 mg lidokaiinihydrokloridia.

Lidocaine Accord 20 mg/ml injektioneeste, liuos: yksi millilitra injektioneestettä sisältää 20 mg lidokaiinihydrokloridia.

Muut aineet ovat natriumkloridi, kloorivetyhappo (pH:n säätöön), natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja injektioneesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Lidocaine Accord on kirkas, väritön, steriili injektioneeste. Sitä on saatavana kahta eri vahvuutta: 10 mg/ml ja 20 mg/ml.

Lidocaine Accord 10 mg/ml injektioneestettä, liuosta, on saatavana

Lasiampulleissa: 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml
 10 x 5 ml, 20 x 5 ml
 10 x 10 ml, 20 x 10 ml

Lasisissa injektio-pulloissa: 1 x 20 ml

Lidocaine Accord 20 mg/ml injektioneestettä, liuosta, on saatavana

Lasiampulleissa: 10 x 2 ml, 20 x 2 ml
 10 x 5 ml, 20 x 5 ml
 10 x 10 ml, 20 x 10 ml

Lasisissa injektio-pulloissa: 1 x 20 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,
Iso-Britannia

Valmistaja

Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Iso-Britannia
Wessling Hungary Kft
Budapest, Fõti út 56.,
1047, Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.10.2015

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa käyttää yhdessä muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Vain kertakäyttöön, käytettävä välittömästi ensimmäisen avaamiskerran jälkeen, käyttämätön liuos on hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat liuoksen värjäytyneen millään tavoin. Injektionestettä ei saa käyttää, jos siinä näkyy hiukkasia.

Antotapa

Lidocaine Accord -valmistetta saavat käyttää vain puudutuksiin perehtyneet, elvytystaitoiset lääkärit, tai sitä voidaan käyttää heidän valvonnassaan. Elvytyslaitteisto on oltava saatavilla paikallispuudutteita annettaessa.

Katso annostustiedot valmisteyhteenvedosta.

Bipacksedel: Information till användaren

Lidocaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
Lidocaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning
lidokainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lidocaine Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lidocaine Accord
3. Hur du använder Lidocaine Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lidocaine Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lidocaine Accord är och vad det används för

Lidocaine Accord är ett lokalbedövningsmedel. Det ger bedövning av en begränsad del av kroppen i samband med små kirurgiska ingrepp. Det hindrar nerverna från att förmedla smärtsignaler till hjärnan, så att du inte känner någon smärta. Det börjar verka några minuter efter injektionen och effekten avtar långsamt när operationen är över.

Lidokainhydroklorid som finns i Lidocaine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lidocaine Accord

Du får inte ges detta läkemedel:

- om du är allergisk mot lidokainhydroklorid, lokalanestetika av amidtyp eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har mycket lågt blodtryck, om du har förlorat för mycket blod eller andra kroppsvätskor eller om ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med blod av andra orsaker ska du inte få Lidocaine Accord som injektion i ryggraden

Om något av ovanstående stämmer in på dig tala med läkare innan du får detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lidocaine Accord

- om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd
- om du har hjärtproblem såsom långsamma eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtsvikt
- om du har en lungsjukdom eller sjukdom i andningsvägarna

- om du har leversjukdom eller njurproblem
- om du har kramper (epilepsi)
- om du har en inflammation eller infektion i området där injektionen ska ges
- om du har porfyri (en ovanlig ärftlig sjukdom som påverkar huden och nervsystemet)
- om du har problem med blodkoagulationen
- om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare innan du får Lidocaine Accord.

Andra läkemedel och Lidocaine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

- andra lokalbedövningsmedel
- läkemedel som används vid behandling av mag- eller tolvfingertarmssår (t.ex. cimetidin)
- läkemedel som används för att behandla oregelbundna hjärtslag (t.ex. amiodaron)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Beroende på dos och administrerings sätt kan Lidocaine Accord ha en tillfällig effekt på din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Fråga din läkare när det är säkert att återuppta dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lidocaine Accord innehåller natrium

Varje ml injektionsvätska, lösning innehåller cirka 0,118 mmol natrium (om styrkan 10 mg/ml används) eller 0,082 mmol natrium (om styrkan 20 mg/ml används). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

3. Hur du använder Lidocaine Accord

Lidocaine Accord ges av en läkare. Det kommer att ges till dig som en injektion i en ven, en muskel, under huden eller i epiduralrummet (en del av ryggraden).

Dosen som läkaren ger beror på vilken typ av smärtstillning du behöver. Den beror också på din kroppsstorlek, ålder, ditt hälsotillstånd och vilken del av kroppen läkemedlet injiceras i. Du kommer att få den lägsta möjliga dos som

ger önskad effekt.

Användning för barn och ungdomar

Dosen ska minskas till barn och patienter med nedsatt allmäntillstånd.

Lidocaine Accord ges oftast nära den del av kroppen där ingreppet ska göras.

Om du har fått för stor mängd av Lidocaine Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Läkaren som behandlar dig har erfarenhet av att hantera allvarliga biverkningar på grund av för stor mängd av Lidocaine Accord.

De första tecknen på att man har fått för stor mängd av Lidocaine Accord är oftast följande:

- kramper
- rastlöshet
- yrsel eller virrighet
- illamående
- domningar eller stickningar i läpparna och runt munnen
- synproblem

Om du får något av ovanstående symtom eller om du tror att du har fått för stor mängd av Lidocaine Accord ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.

Allvarligare biverkningar från att ha fått för stor mängd av Lidocaine Accord kan uppstå, som t.ex. balans- och koordinationsstörningar, hörseländringar, eufori, förvirring, problem med talet, blekhet, svettningar, skakningar, krampanfall, påverkan på hjärtat och blodkärlen, medvetandeförlust, koma och korta andningsstopp (apné).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk chock) ska du kontakta läkare eller sköterska omedelbart. Tecken på detta kan vara plötslig uppkomst av följande symtom:

- svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, som kan göra det svårt att svälja
- kraftig eller plötslig svullnad av händer, fötter och vristar
- andningssvårigheter
- svår hudklåda (med upphöjda knölar)
- feber
- blodtrycksfall

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Andra möjliga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- lågt blodtryck
- illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- myrkrypningar
- yrsel
- långsam hjärtrytm
- högt blodtryck
- kräkningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- kramper
- domningar av tungan eller stickningar runt munnen
- ringningar i öronen eller känslighet för ljud
- synrubbningar
- medvetandeförlust
- skakningar
- dåsighet
- virrighet
- tinnitus
- berusningskänsla
- talsvårigheter

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- överkänslighetsreaktioner som nässelfeber (urtikaria), hudutslag, hudsvullnad (angioödem) och i allvarigare fall anafylaktisk chock
- känsel förändringar eller muskelsvaghet (neuropati)
- inflammation i ett membran som omger ryggmärgen (araknoidit) som kan ge smärta i nedre delen av ryggen, eller smärta, domningar eller svaghet i benen
- dubbelseende
- oregelbundna hjärtslag eller hjärtstillestånd
- långsam andning eller andningsstopp

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Lidocaine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på ampullen/injektionsflaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Tillverkare:

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannien

Wessling Hungary Kft
Budapest, Fötiút 56,
1047, Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast 13.10.2015

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Endast för engångsbruk. Ska användas omedelbart efter första öppnandet. Allt överblivet material kasseras.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker missfärgning. Injektionsvätskan, lösningen ska inte användas om den innehåller partiklar.

Administreringssätt

Lidocaine Accord ska endast användas av läkare med erfarenhet av regionalanestesi och återupplivning eller under dennes övervakning. Återupplivningsutrustning ska finnas tillgänglig vid administrering av lokalanestesi.

Se produktresumén för doseringsinformation.