

## Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

### GEFINA® 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

finasteridi

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Gefina on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gefinaa
3. Miten Gefinaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Gefinan säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Gefina on ja mielin sitä käytetään**

Gefinaa käytetään miehillä hoitamaan ja hallitsemaan:

- **eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua.**

Finasteridi kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä 5-alfareduktaasin estäjät. Se pienentää suurentunutta eturauhasta parantaen virtsan virtausta ja muita eturauhasen liikakasvun oireita. Gefina pienentää äkillisen-virtsaummen riskiä ja vähentää leikkaushoidon tarvetta.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gefinaa**

**Älä käytä Gefinaa**

jos olet

- **allerginen finasteridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).**
- **nainen**
- **alle 18-vuotias lapsi.**

Suurentuneen eturauhasen lääkehoidon osalta on suositeltavaa konsultoida urologia.

#### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Gefinaa.

Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista koskee sinua:

- sinulla on **vaikeuksia tyhjentää virtsarakkosi** kokonaan tai **virttasuihkusi on heikentynyt huomattavasti**. Lääkäri tutkii sinut huolellisesti ennen Gefina –hoidon aloittamista, jotta muut syyt virtsatietukkeumaan voidaan sulkea pois.
- sinulta otetaan **verikoe**, jolla mitataan **PSA**:ta, eturauhasen tuottamaa proteiinia. Kerro lääkärille tai hoitajalle että käytät Gefinaa, koska se voi vaikuttaa kokeen tuloksiin.

Naiset, jotka ovat tai saattavat olla raskaana, eivät saa altistua finasteridille (esimerkiksi siemennesteen väilyksellä tai käsittelemällä rikkoutuneita tai murskaantuneita Gefina -tabletteja, katso kohta Raskaus ja imetyks).

### **Mielialan muutokset ja masennus**

Mielialan muutoksia kuten masentunutta mielialaa, masennusta ja harvemmissa tapauksissa itsemurha-ajatuksia on raportoitu esiintyneen Gefina saaneilla potilailla. Jos sinulla esiintyy mitä tahansa näistä oireista, käännny mahdollisimman pian lääkärin puoleen saadaksesi lisähohjeistusta.

### **Muut lääkevalmisteet ja Gefina**

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin ottanut käyttänyt tai saatat joutua ottamaan käyttämään muita lääkkeitä.

Finasteridin ei tiedetä **vaikuttavan** muihin lääkkeisiin, eikä muiden lääkkeiden finasteridiin.

### **Raskaus ja imetyks**

Naiset eivät saa käyttää Gefinaa.

- Jos sukupuolikumppani on tai saattaa olla raskaana:  
Siemennesteessä voi olla pieniä määriä finasteridiä. Siksi sinun tulee **välttää altistamasta kumppaniasi siemennesteellesi**, esimerkiksi käyttämällä kondomia.
- Naiset, jotka ovat tai saattavat olla raskaana, **eivät saa käsitellä rikkoutuneita tai murskattuja Gefina –kalvopäällysteisiä tabletteja**.  
Jos finasteridiä imeytyy raskaana olevaan naiseen, syntyvällä poikapuolisella sikiöllä saattaa olla sukuelinten epämuodostuma. Tableteissa on tästä syystä kalvopäällyste, joka estää kosketuksen finasteridin kanssa.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Ei ole olemassa tietoa, joka osoittaisi Gefinan **vaikuttavan** ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

### **Gefina sisältää laktoosia**

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin **sokeri-intoleranssi**, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisten ottamista.

## **3. Miten Gefinaa käytetään**

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Suositeltu annos on:**

- **yksi tabletti kerran vuorokaudessa.**

### **Antotapa**

Niele kalvopäällysteinen tabletti kokonaisena vesilasillisen kera. Voit ottaa lääkkeen ruuan kanssa tai ilman, kuitenkin aina samaan kellonaikaan.

### **Hoidon kesto**

Hoitava **lääkäri päättää** hoidon kestosta.

Vaikka paranemista voidaan usein havaita lyhyen ajan kuluessa, hoitoa on kuitenkin jatkettava vähintään 6 kuukauden ajan.

### **Jos otat enemmän Gefinaa kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkyystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi

### **Jos unohdat ottaa Gefinaa**

Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos normaaliammottuksen mukaisesti.

### **Jos lopetat Gefinan käytön**

Alä muuta tai lopeta hoitoa ilman lääkärin lupaa, sillä se saattaa aiheuttaa sinulle vakavaa haittaa tai heikentää hoidon tehoa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat erektovaikeudet ja seksuaalisen halukkuuden väheneminen. Näitä haittavaikutuksia esiintyy hoidon alkuvaiheessa ja ne poistuvat valtaosalla potilaista hoidon jatkessa.

Ilmoita lääkärille välittömästi rintakudoksessa tapahtuvista muutoksista, kuten kyhmyistä, kivusta tai nänneritteestä, sillä ne voivat olla merkki vaarallisesta sairaudesta, kuten rintasyövästä.

### **Allergiset reaktiot**

Lopeta Gefinan käyttö ja käänny lääkärin puoleen heti, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista oireista:

- Ihottuma, kutina tai ihonalaiset paukamat (nokkosrokko)
  - Huulten, kielen, nielun ja kasvojen turpoaminen, nielemisvaikeudet, hengitysvaikeudet (angioedeema)
- Tämän haittavaikutuksen yleisyydestä saatavissa oleva tieto ei riitää arviointiin.

### **Haittavaikutuksia voi ilmaantua seuraavien esiintyyystiheyksien mukaan:**

**Yleiset** (voi vaikuttaa enintään 1 käyttäjään 10:sta):

- kyvyttömyys saavuttaa erektili
- sukupuolisen halun heikkeneminen
- kertasiemennesteen määrään väheneminen

**Melko harvinaiset** (voi vaikuttaa enintään 1 käyttäjään 100:sta):

- Ihottuma
- rintojen arkuus ja/tai suureneminen
- siemensyöksyvaikeudet

**Hyvin harvinaiset** (voi vaikuttaa enintään 1 käyttäjään 10 000:sta):

- eritys rinnasta
- kyhmyt rinnassa (voivat vaatia kirurgista poistoa yksittäisillä potilailla)

**Tuntematon** (koska saatavissa oleva tieto ei riitää arviointiin):

- masennus
- sydämentykytys
- maksentsyymien kohoaminen
- ihmisen kutina ja nokkosihottuma
- kiveskipu

- erektoikyvyttömyys, joka jatkuu hoidon lopettamisen jälkeen
- sukupuolisen halukkuuden väheneminen, joka jatkuu hoidon lopettamisen jälkeen
- miehen hedelmättömyys ja/tai siemennesteen huono laatu
- ahdistuneisuus.

#### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset **haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle**. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea

#### **5. Gefinan säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

#### **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

##### **Mitä Gefina sisältää**

- **Vaikuttava aine on finasteridi.**  
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia.
- Muut aineet ovat:
  - dokusaattinatrium
  - hypromelloosi
  - indigokarmiini (E132)
  - laktoosimonohydraatti
  - magnesiumstearaatti
  - mikrokiteinen selluloosa
  - povidoni K30
  - propyleeniglykoli
  - natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)
  - talkki
  - titaanidioksidi (E171)

##### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot**

Gefina 5 mg on sininen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, joka on noin 8 mm halkaisijaltaan.

Kalvopäällystetyt tabletit on pakattu seuraaviin pakauskokoihin:

10, 15, 30, 50, 60, 100 ja 120 kalvopäällysteistä tablettia standardiläpipainopakkauksissa  
14, 28 ja 56 kalvopäällysteistä tablettia viikkopakkauksissa

50 kalvopäälysteistä tablettia (50 x 1) kerta-annos läpipainopakkauksissa

Kaikkia pakkauuskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

**Valmistaja**

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Saksa

**Tämä seloste on tarkistettu viimeksi**

27.7.2018

## Bipacksedel: Information till patienten

### GEFINA® 5 mg tablett, filmdragerad

finasterid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Gefina är och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du tar Gefina
3. Hur du tar Gefina
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gefina ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Gefina är och vad används det för**

Gefina används för män vid behandling och kontroll av:

- **en godartad förstoring av prostatan.**

Gefina tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. Det verkar genom att förminska storleken på prostata, förbättrar urinflödet och andra symtom på prostataförstoring. Gefina minskar risken för att man plötsligt inte ska kunna kissa och behov av operation.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Gefina**

##### **Använd inte Gefina**

om du är

- **allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).**
- **kvinna**
- **ett barn under 18 år.**

I samband med läkemedelsbehandling av förstorad prostata bör du kontakta med en urolog.

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du tar Gefina.

Tala om för din läkare om något av följande gäller dig:

- du har **svårigheter att tömma blåsan** helt eller har kraftigt **minskat urinflöde**.  
Din läkare kommer att undersöka dig innan du börjar behandlingen med Gefina för att utesluta andra hinder i urinvägarna.
- du behöver genomföra **ett blodtest** som heter **“PSA”**, ett protein som produceras i prostatakörteln.  
Tala om för läkaren eller för sjuksköterskan att du tar Gefina eftersom detta kan förändra testresultaten.

Kvinnor som är eller kan vara gravida ska inte komma i kontakt med finasterid (till exempel genom sädesvätska eller genom delade eller krossade tabletter - se avsnittet "Graviditet och amning").

### **Humörsvängningar och depression**

Humörsvängningar såsom nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmordstankar har rapporterats vid användning av Gefina. Om du upplever något av dessa symtom ska du kontakta läkare så snart som möjligt för ytterligare medicinsk rådgivning.

### **Andra läkemedel och Gefina**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Finasterid är **inte känt för att påverka** eller påverkas av andra läkemedel.

### **Graviditet och amning**

**Kvinnorna får inte använda** Gefina.

- Om din sexualpartner är eller kan vara gravid:  
Sädesvätska kan innehålla små mängder av Gefina. Därför måste du **se till att inte din sädesvätska** kan komma i kontakt med **din partner**, till exempel genom att använda kondom.
- Kvinnor som är eller kan vara gravida ska **inte hantera sönderdelade eller krossade Gefina-filmdragerade tabletter**.  
Om Gefina upptas av en kvinna som är gravid med ett pojkfoster, kan barnet födas med missbildade könsorgan. Tabletterna är filmdragerade så att kroppen inte kommer i kontakt med finasterid.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Det finns inga data som tyder på att Gefina **påverkar förmågan** att köra bil eller använda maskiner.

### **Gefina innehåller laktos**

Om du inte tål vissa **sockerarter**, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **3. Hur du tar Gefina**

Ta alltid Gefina enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonalen om du är osäker.

### **Rekomenderad dos är:**

- **1 tablett en gång dagligen.**

### **Administreringssätt**

Filmdragerade tabletten ska sväljas hel med ett glas vatten. Du kan ta läkemedlet med eller utan mat dock alltid vid samma tidpunkt varje dag.

### **Behandlingstiden**

#### **Bestäms av läkaren.**

Även om det ofta inträffar en förbättring efter kort tid är det nödvändigt att fortsätta behandlingen under minst 6 månader.

### **Om du har tagit för stor mängd av Gefina**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att ta Gefina**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen enligt den normala doseringen.

## **Om du slutar att ta Gefina**

Ändra eller avsluta inte behandlingen utan läkarens tillstånd då detta kan skada dig allvarligt och minska effekten av behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna är oförmåga att få erekction samt minskad sexlust. Dessa biverkningar kommer tidigt under behandlingen och försvinner hos de flesta patienter vid fortsatt behandling.

Du ska omedelbart tala om för din läkare om du får förändringar i bröstvävnaden, t.ex. knölar, smärta eller flytning från bröstvårtorna, eftersom sådana förändringar kan vara tecken på en allvarlig sjukdom såsom bröstcancer.

### **Allergiska reaktioner**

Sluta använda Gefina och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

- Hudutslag, klåda eller knölar under huden (nässelutslag)
- Svullnad av läppar, tunga, svalg och ansikte, svårigheter att svälja, andnöd (angioödem)

Denna biverkning förekommer hos okänt antal användare.

### **Biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:**

**Vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- oförmåga att få erekction
- minskad sexuell lust
- minskad mängd ejakulat

**Mindre vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- utslag
- bröstömhet och/eller bröstdförstörning
- ejakulationsvårigheter

**Mycket sällsynta** (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- utsöndring från brösten
- knölar i brösten (som hos enskilda patienter kan kräva kirurgiskt avlägsnande).

**Har rapporterats** (förekommer hos okänt antal användare):

- depression
- hjärtklappning
- förhöjda levervärden
- klåda och nässelutslag
- testikelsmärta
- oförmåga att få erekction som kvarstår när behandlingen har avslutats
- nedsatt sexlust som kvarstår när behandlingen har avslutats
- manlig ofruktsamhet och/eller dålig spermakvalitet
- ångest.

## **Rapportering av biverkningar**

Om du får **biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal**. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, FI-00034 Fimea. Webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

## 5. Hur Gefina ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Detta åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är **finasterid**.  
En filmdragerad tablett innehåller 5 mg finasterid.
- Övriga innehållsämnen är
  - dokusatnatrium
  - hypromellos
  - indigokarmin (E132)
  - laktosmonohydrat
  - magnesiumstearat
  - mikrokristallin cellulosa
  - povidon K30
  - propylenglykol
  - natriumstärkelseglykolat (typ A)
  - talk
  - titandioxid (E171)

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gefina 5 mg är en blå, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, cirka 8 mm i diameter.

De filmdragerade tablettter tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

10, 15, 30, 50, 60, 100, 120 filmdragerade tablettter i blisterförpackningar

14, 28 ja 56 filmdragerade tablettter i veckoförpackningar

50 filmdragerade tablettter (50 x 1) i endos blisterförpackningar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av försäljningstillstånd

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

### Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Tyskland

**Denna bipacksedel ändrades senast**  
27.7.2018