

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Atorvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg kalvopäällysteinen tabletti atorvastatiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Atorvastatin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atorvastatin ratiopharm -tabletteja
3. Miten Atorvastatin ratiopharm -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Atorvastatin ratiopharm -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Atorvastatin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Atorvastatin ratiopharm kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan statiineiksi. Statiineilla säädellään veren lipidi(rasva)tasoja.

Atorvastatin ratiopharm -tabletteja käytetään alentamaan veren rasvojen eli kolesterolin ja triglyseridien tasoja silloin, kun se ei ole onnistunut vähärasvaisella ruokavaliolla ja elintapamuutoksilla. Atorvastatin ratiopharm -tabletteja voidaan käyttää myös silloin, jos sydäntautiriski on suurentunut normaaleista kolesterolitasoista huolimatta. Tavanomaista kolesterolitasoja alentavaa ruokavaliota on jatkettava myös hoidon aikana.

Atorvastatiinia, jota Atorvastatin ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atorvastatin ratiopharm -tabletteja

Älä käytä Atorvastatin ratiopharm -tabletteja

- jos olet allerginen atorvastatiinille tai samantyyppisille veren rasvatasoja alentaville lääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on tai on joskus ollut jokin maksan toimintaan vaikuttava sairaus
- jos maksan toimintaa mittaavista verikokeista on saatu epäselviksi jääneitä epänormaaleja tuloksia
- jos olet lisääntymiskykyinen nainen etkä käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä
- jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi
- jos imetät
- jos käytät glekapreviirin/pibrentasviirin yhdistelmää hepatiitti C:n hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Atorvastatin ratiopharm -tabletteja:

- jos käytät tai olet viimeisen 7 päivän aikana käyttänyt fusidiinihappoa (bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä lääke) suun kautta tai injektiona. Fusidiinihapon ja Atorvastatin ratiopharm -tablettien samanaikainen käyttö saattaa johtaa vakaviin lihashaittoihin (rabdomyolyyysi).

- jos sinulla on ollut aivohalvaus johon on liittynyt aivoverenvuotoa, tai sinulla on aivoissa pieniä nestetaskuja aiempien aivohalvausten jäljiltä
- jos sinulla on munuaisvaivoja
- jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi)
- jos sinulla on ollut toistuvia tai selittämättömiä lihassärkyjä tai sinulla tai sukulaisellasi on ollut lihasvaivoja
- jos sinulla on ollut lihasvaivoja aiemman veren rasvatasoja alentavan lääkehoidon (esim. muiden statiini- tai fibraattilääkkeiden) käytön yhteydessä
- jos käytät säännöllisesti runsaasti alkoholia
- jos sinulla on ollut jokin maksasairaus
- jos olet yli 70-vuotias

Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, lääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso, kohonneet veren rasva-arvot, olet ylipainoinen tai sinulla on korkea verenpaine.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Atorvastatin ratiopharm -tablettien käyttöä:

- jos sinulla on vakava hengitysvajaus

Jos jokin edellä mainituista kohdista koskee sinua, lääkärin on tehtävä sinulle ennen Atorvastatin ratiopharm -hoidon aloittamista ja mahdollisesti myös hoidon aikana verikoe, jonka avulla voidaan ennustaa lihaksiin kohdistuvien haittavaikutusten riski. Tällaisten haittavaikutusten, esim. rbdomyolyysin, riskin tiedetään kasvavan, jos atorvastatiinia käytetään samanaikaisesti tiettyjen lääkkeiden kanssa (ks. kohta 2 ”Muut lääkevalmisteet ja Atorvastatin ratiopharm”).

Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja -lääkitys voivat olla tarpeen sen diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.

Muut lääkevalmisteet ja Atorvastatin ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat muuttaa Atorvastatin ratiopharm -tablettien vaikutusta, tai Atorvastatin ratiopharm voi muuttaa niiden vaikutusta. Tällainen yhteisvaikutus voi heikentää jommankumman lääkkeen tai molempien lääkkeiden tehoa. Seuraavien lääkkeiden yhteiskäyttö voi myös suurentaa haittavaikutusten riskiä tai voimistaa haittavaikutuksia esim. rbdomyolyysi, joka on merkittävä lihaksia kiihdyttävä sairaus, (ks. kohta 4):

- **jos sinun on otettava fusidiinihappoa suun kautta bakteeri-infektion hoitoon, sinun on tilapäisesti keskeytettävä tämän lääkkeen käyttö. Lääkäri kertoo milloin on turvallista jatkaa Atorvastatin ratiopharm -tablettien käyttöä. Atorvastatin ratiopharm -tablettien ja fusidiinihapon samanaikainen käyttö saattaa harvoin aiheuttaa lihasheikkoutta, lihasten arkuutta tai lihaskipua (rbdomyolyysi). Katso kohdasta 4 lisätietoa rbdomyolyysistä.**
- immuunijärjestelmän toimintaa muuttavat lääkkeet, kuten siklosporiini
- muut antibiootit (bakteeri-infektioiden hoitoon käytettyjä lääkkeitä) tai sienilääkkeet, kuten erytromysiini, klaritromysiini, telitromysiini, ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, flukonatsoli, posakonatsoli, rifampisiini
- muut veren rasvatasoja säätelevät lääkkeet, kuten gemfibrotsiili, muut fibraatit, kolestipoli, jotkut kalsiumsalpaajat (rasitusrintakipujen ja korkean verenpaineen hoitoon), esim. amlodipiini, diltiatseemi, sekä rytmihäiriölääkkeet, esim. digoksiini, verapamiili ja amiodaroni
- HIV:n hoitoon käytetyt lääkkeet, esim. ritonaviiri, lopinaviiri, atatsanaviiri, indinaviiri, darunaviiri, tipranaviirin ja ritonaviirin yhdistelmä jne.
- jotkut hepatiitti C:n hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten telapreviiri, bosepreviiri ja elbasviirin/gratsopreviirin yhdistelmä
- muita lääkkeitä, joilla tiedetään olevan yhteisvaikutus atorvastatiinin kanssa: etsetimibi (alentaa kolesterolia), varfariini (estää veren hyytymistä), suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet, stiripentoli (epilepsian hoitoon käytettävä kouristuksia estävä lääke), simetidiini (käytetään närästyksen ja mahahaavan hoitoon), fenatsoni (kipulääke), kolkisiini (käytetään kihdin hoitoon) ja antasidit (alumiinia tai magnesiumia sisältävät ruoansulatushäiriöiden lääkkeet)
- Itsehoitolääkkeet: mäkikuisma.

Atorvastatin ratiopharm ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Katso kohdasta 3 ohjeet Atorvastatin ratiopharm -tablettien ottamiseen. Ota huomioon seuraavat seikat:

Greippimehu

Nauti greippimehua enintään yksi tai kaksi pientä lasillista päivässä, koska suuret määrät greippimehua voivat muuttaa Atorvastatin ratiopharm -tablettien vaikutuksia.

Alkoholi

Vältä alkoholin liiallista käyttöä tämän lääkehoidon aikana. Katso lisätietoja kohdasta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä ota Atorvastatin ratiopharm -tabletteja, jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi. Älä käytä Atorvastatin ratiopharm -tabletteja jos voit tulla raskaaksi, etkä käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä. Älä ota Atorvastatin ratiopharm -tabletteja, jos imetät.

Atorvastatin ratiopharm -tablettien turvallisuutta raskaus- ja imetysaikana ei ole toistaiseksi osoitettu. Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tavallisesti tämä lääke ei vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Älä kuitenkaan aja, jos tämä lääke vaikuttaa ajokykyysi. Älä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos tämä lääke vaikuttaa kykyysi käyttää niitä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Atorvastatin ratiopharm -tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen hoidon aloittamista lääkärisi määrää sinulle kolesterolia alentavan ruokavalion, jota on jatkettava myös Atorvastatin ratiopharm -hoidon aikana.

Suosittelun aloitusannos **aikuisille ja 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille** on 10 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annostusta, kunnes se on riittävä. Lääkäri tarkistaa annostuksen neljän viikon välein tai harvemmin. Atorvastatin ratiopharm -valmisteen enimmäisannos on 80 mg vuorokaudessa.

Atorvastatin ratiopharm -tabletit niellä kokonaisina suun kautta veden kera mihin vuorokaudenaikaan tahansa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Yritä kuitenkin ottaa tablettisi joka päivä samaan aikaan.

Lääkäri arvioi, kuinka pitkään tarvitset Atorvastatin ratiopharm -hoitoa.

Käännä lääkärin puoleen, jos sinusta tuntuu, että Atorvastatin ratiopharm -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.

Jos otat enemmän Atorvastatin ratiopharm -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Atorvastatin ratiopharm -tabletteja

Jos unohdit ottaa annoksen, ota seuraava annoksesi oikeaan aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseksi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Atorvastatin ratiopharm -tablettien käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä tai haluat lopettaa lääkkeen käytön, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista tai oireista, lopeta tablettien käyttö ja kerro välittömästi lääkärille tai mene lähimmän sairaalan ensiapuun.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

- Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, kielen ja kurkun turvotusta ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia
- Vakava sairaus joka aiheuttaa ihon vaikeaa kuoriutumista ja turvotusta, rakkuloiden muodostumista iholle, suuhun, silmiin ja sukupuolielimiin sekä kuumetta. Ihottuma johon liittyy vaaleanpunaisia tai punertavia läiskiä erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa ja joista saattaa muodostua rakkuloita
- Lihasteikkous, -arkuus, -kipu, -repeämä tai virtsan värjäytymistä punaruskeaksi ja erityisesti jos samanaikaisesti tunnet huonovointisuutta tai sinulla on korkea kuume, saattaa johtua epänormaalista lihasten hajoamisesta (rabdomyolyysi). Epänormaali lihasten hajoaminen ei välttämättä lopu, vaikka olisit lopettanut atorvastatiinin käytön, ja se voi olla henkeä uhkaava ja saattaa johtaa munuaisongelmiin.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta)

- Lupuksen kaltainen oireisto (mm. ihottuma, niveleireet ja verisoluihin kohdistuvat vaikutukset)
- Jos sinulla ilmenee ongelmia, joihin liittyy odottamatonta tai epätavallista verenvuotoa tai mustelmien muodostusta, tämä saattaa viitata maksavaivoihin. Sinun on mahdollisimman nopeasti otettava yhteyttä lääkäriin

Atorvastatin ratiopharm -tablettien muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- nenäkäytävien tulehdus, kurkkukipu, nenäverenvuoto
- allergiset reaktiot
- verensokeritasojen nousu (jos sinulla on diabetes jatka verensokeritason huolellista seurantaa), veren kreatiiniinikinaasiarvon kasvu
- päänsärky
- pahoinvointi, ummetus, ilmavaivat, ruoansulatushäiriöt, ripuli
- nivelkipu, lihaskipu ja selkäkipu
- epänormaalit muutokset maksan toimintaa kuvaavissa verikokeissa

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- Ruokahaluttomuus, painon nousu, verensokeriarvojen lasku (jos sinulla on diabetes jatka verensokeritason huolellista seurantaa)
- painajaiset, unettomuus
- huimaus, sormien ja varpaiden tunnottomuus ja pistely, kipu- ja tuntoaistin heikkeneminen, makuuain muutokset, muistinmenetys

- näön hämärtyminen
- korvien ja/tai pään soiminen
- oksentelu, röyhtäily, ylä- ja alavatsan kipu, pankreatiitti (haimatulehdus josta seuraa vatsakipua)
- hepatiitti (maksatulehdus)
- ihottuma, ihottuma ja kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö
- niskakipu, lihasväsymys
- uupumus, huonovointisuus, heikotus, rintakipu, turvotus erityisesti nilkoissa (edeema), kuume
- positiivinen virtsan valkosolukoe

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

- näköhäiriöt
- odottamaton verenvuoto ja mustelman muodostus
- kolestaasi (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus)
- jänneaurio

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

- allerginen reaktio – oireita voivat olla äkillinen hengityksen vinkuminen ja rintakipu tai kireyden tunne rinnassa, silmäluomien, kasvojen, huulien, kielen ja kurkun turpoaminen, hengitysvaikeudet, kollapsi
- kuulon menetys
- gynekomastia (rintojen suureneminen miehillä)

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- jatkuva lihasheikkous

Joillakin statiineilla (samantyyppisiä lääkkeitä) raportoituja mahdollisia haittavaikutuksia:

- seksuaaliset vaikeudet
- masennus
- hengitysvaikeudet, jatkuva yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume.
- Diabetes. Esiintyminen on todennäköisempää jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja rasva-arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa tilannettasi tämän lääkkeen käytön aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Atorvastatin ratiopharm -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim./EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Atorvastatin ratiopharm sisältää

- Vaikuttava aine on atorvastatiini.
Yksi tabletti sisältää 10 mg, 20 mg, 40 mg tai 80 mg atorvastatiinia (atorvastatiinikalsiumina).
- Muut tabletin aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumkarbonaatti, maltoosi, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.
Muut kalvopäällysteen aineet ovat hypromelloosi (E464), hydroksipropyyliselluloosa, trietyylisitraatti (E1505), polysorbaatti 80 ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

- *10 mg:* Atorvastatin ratiopharm kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, soikeita, kaksoiskuperia ja sileitä kalvopäällysteisiä tabletteja. Tabletin mitat ovat noin 9,7 mm x 5,2 mm.
20 mg: Atorvastatin ratiopharm kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, soikeita, kaksoiskuperia ja sileitä kalvopäällysteisiä tabletteja. Tabletin mitat ovat noin 12,5 mm x 6,6 mm.
40 mg: Atorvastatin ratiopharm kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, soikeita, kaksoiskuperia ja sileitä kalvopäällysteisiä tabletteja. Tabletin mitat ovat noin 15,6 mm x 8,3 mm.
80 mg: Atorvastatin ratiopharm kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, soikeita, kaksoiskuperia ja sileitä kalvopäällysteisiä tabletteja. Tabletin mitat ovat noin 18,8 mm x 10,3 mm.
- Atorvastatin ratiopharm -tabletteja on saatavilla alumiini/alumiiniläpipainopakkauksessa, joiden pakkauskoot ovat 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tai 200 tablettia, sekä suuritiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistetuissa muovipurkeissa, joiden pakkauskoot ovat 50 tai 100 tablettia ja 100 tabletin monipakkaus (sis. kaksi 50 tabletin pakkausta).
- Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Ruotsi

Valmistaja

Teva Pharma S.L.U, Zaragoza, Espanja
TEVA UK Ltd., Eastbourne, Iso-Britannia
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Puola
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Saksa
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Alankomaat

Lisätietoja tästä valmisteesta antaa myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy
PL 67
02631 Espoo
puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.5.2019.

Bipacksedel: information till användaren

Atorvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg filmdragerade tabletter atorvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atorvastatin ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin ratiopharm
3. Hur du använder Atorvastatin ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atorvastatin ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atorvastatin ratiopharm är och vad det används för

Atorvastatin ratiopharm tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som används för att reglera lipidhalterna (fetthalterna) i blodet.

Atorvastatin ratiopharm används vid behandling av förhöjda blodfetter, även kallat kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin ratiopharm också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer skulle vara normala. Du bör bibehålla en kolesterolfattig diet under behandlingen.

Atorvastatin som finns i Atorvastatin ratiopharm kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin ratiopharm

Använd inte Atorvastatin ratiopharm

- om du är allergisk mot atorvastatin, mot något annat läkemedel som används för att sänka blodfetter, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern
- om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden
- om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder ett tillförlitligt preventivmedel
- om du är gravid eller försöker bli gravid
- om du ammar
- om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atorvastatin ratiopharm:

- om du tar eller inom de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fucidinsyra (ett läkemedel mot bakteriella infektioner) via munnen eller som injektioner. Kombinationen av fucidinsyra och Atorvastatin ratiopharm kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys).
- om du tidigare har haft stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor med vätska i hjärnan efter en tidigare stroke
- om du har njurproblem
- om du har underaktiv sköldkörtel (hypotyroidism)

- om du har haft upprepade och oförklarliga muskelsmärter eller muskelproblem personligen eller i familjen
- om du tidigare har haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t.ex. andra statiner eller fibrater)
- om du regelbundet dricker stora mängder alkohol
- om du har haft någon leversjukdom
- om du är över 70 år.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig eller har högt blodtryck.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin ratiopharm:

- om du har allvarligt nedsatt lungfunktion

Om något av detta stämmer in på dig behöver din läkare utföra blodprovsundersökningar före och möjligen under din behandling med Atorvastatin ratiopharm för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, t.ex. rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans med atorvastatin (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorvastatin ratiopharm”).

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Andra läkemedel och Atorvastatin ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin ratiopharm, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastatin ratiopharm. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, samt allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, som beskrivs i avsnitt 4.

- **Om du måste ta fucidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt sluta ta detta läkemedel. Din läkare kommer att säga till när det är säkert att ta Atorvastatin ratiopharm igen. Användning av Atorvastatin ratiopharm tillsammans med fucidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information avseende rabdomyolys i avsnitt 4.**
- Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t.ex. ciklosporin
- Andra antibiotika (läkemedel mot bakteriella infektioner) eller medel mot svampinfektioner, t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin
- Andra blodfettssänkande läkemedel, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater, kolestipol, vissa kalciumflödeshämmare (som används mot kärlkramp och högt blodtryck), t.ex. amlodipin, diltiazem samt läkemedel som reglerar hjärtrytmen, t.ex. digoxin, verapamil och amiodaron
- Läkemedel som används vid HIV-behandling, t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, en kombination av tipranavir och ritonavir etc.
- Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t.ex. telaprevir, boceprevir och en kombination av elbasvir och grazoprevir
- Andra läkemedel kända för att interagera med atorvastatin inkluderar ezetimib (kolesterolsänkande läkemedel), warfarin (blodförtunnande), orala preventivmedel (p-piller), stiripentol (krampförebyggande medel vid epilepsi), cimetidin (läkemedel mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot gikt) och antacida (läkemedel som innehåller aluminium eller magnesium och som används mot matsmältningsproblem)
- Receptfria läkemedel: Johannesört

Atorvastatin ratiopharm med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 ”Hur du använder Atorvastatin ratiopharm” för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin ratiopharm. Observera följande:

Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, eftersom stora mängder grapefruktjuice kan påverka effekten av Atorvastatin ratiopharm.

Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för ytterligare information.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Atorvastatin ratiopharm under graviditet eller om du försöker bli gravid.

Använd inte Atorvastatin ratiopharm om du är en kvinna i fertil ålder, såvida du inte använder ett tillförlitligt preventivmedel.

Använd inte Atorvastatin ratiopharm om du ammar.

Säkerheten av Atorvastatin ratiopharm under graviditet och amning har ännu inte säkerställts.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel påverkar normalt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör dock inte bil om detta läkemedel påverkar din förmåga att köra. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Atorvastatin ratiopharm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på en kolesterolfattig diet, vilken du ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin ratiopharm.

Rekommenderad startdos är 10 mg dagligen **för vuxna och barn som är 10 år eller äldre**. Dosen kan ökas gradvis av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kan justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin ratiopharm är 80 mg dagligen.

Atorvastatin ratiopharm tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta dosen vid samma tidpunkt varje dag.

Behandlingstiden med Atorvastatin ratiopharm bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin ratiopharm är för stark eller för svag.

Om du har tagit för stor mängd av Atorvastatin ratiopharm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Atorvastatin ratiopharm

Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Atorvastatin ratiopharm

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta behandlingen, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symtom, sluta att ta dina tabletter och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- Allvarlig allergisk reaktion med svullnad i ansikte, tunga och hals vilket kan orsaka allvarliga andningssvårigheter.
- Allvarlig sjukdom med kraftig fjällning och svullnad av huden, blåsbildning på hud, i mun, ögon, könsorgan, och feber. Rosa-röda fläckvisa hudutslag, speciellt på handflator eller fotsulor, vilka kan övergå till blåsor.
- Muskelsvaghet, -ömheter, -smärta, -ruptur eller rödbrun färgning av urin och särskilt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på onormal muskelnedbrytning (rabdomyolys), vilket inte alltid går över även om behandlingen med atorvastatin avslutas, och som kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Lupusliknande sjukdomsbild (bl.a. utslag, ledsymtom och påverkan på blodcellerna)
- Om du upplever problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken, kan detta tyda på en leverpåverkan. Prata med din läkare så snart som möjligt.

Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin ratiopharm:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) :

- inflammation i näsgångarna, ont i halsen, näsblod
- allergiska reaktioner
- ökade blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), ökad kreatinkinashalt i blodet
- huvudvärk
- illamående, förstoppning, gaser i magen, matsmältningsbesvär, diarré
- ledvärk, muskelvärk och ryggvärk
- förändringar i de blodprovresultat som visar hur din lever fungerar.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- aptitlöshet, viktökning, sänkta blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)
- mardrömmar, sömnlöshet
- yrsel, domningar eller myrkrypningar i fingrar och tår, minskad känslighet för smärta eller beröring, förändrade smakupplevelser, minnesförlust
- dimsyn
- ringningar i öron och/eller huvud

- kräkningar, rapningar, buksmärta (övre och nedre), pankreatit (inflammation i bukspottkörteln vilket ger buksmärtor)
- hepatit (inflammation i levern)
- hudutslag och klåda, nässelutslag, håravfall
- smärta i nacken, muskelsvaghet
- trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnader framförallt vid anklarna (ödem), feber
- urintester som är positiva för vita blodkroppar.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- synpåverkan
- oväntade blödningar eller blåmärken
- kolestas (hud och ögonvitor blir gula)
- senskada.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- en allergisk reaktion – symtom som kan förekomma är plötsligt väsande andning och bröstsmärta eller tryckkänsla över bröstet, svullnad av ögonlocken, ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, andningssvårigheter, kollaps
- hörselnedsättning
- gynekomasti (bröstförstoring hos män).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- muskelsvaghet som är ihållande.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

- nedsatt sexuell förmåga
- depression
- andningsbesvär, inklusive ihållande hosta och/eller andfäddhet eller feber
- Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att följa upp ditt tillstånd medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA.

5. Hur Atorvastatin ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är atorvastatin.
Varje tablett innehåller atorvastatinkalcium i en mängd som motsvarar 10, 20, 40 eller 80 mg atorvastatin.

- Övriga innehållsämnen i tabletkärnan är mikrokristallin cellulosa, natriumkarbonat, maltos, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.
Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, trietylcitrat (E1505), polysorbat 80 och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

- *10 mg*: Atorvastatin ratiopharm filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala, bikonvexa med slät yta. Dimensionerna på varje tablett är ca 9,7 x 5,2 mm.
20 mg: Atorvastatin ratiopharm filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala, bikonvexa med slät yta. Dimensionerna på varje tablett är ca 12,5 x 6,6 mm.
40 mg: Atorvastatin ratiopharm filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala, bikonvexa med slät yta. Dimensionerna på varje tablett är ca 15,6 x 8,3 mm.
80 mg: Atorvastatin ratiopharm filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala, bikonvexa med slät yta. Dimensionerna på varje tablett är ca 18,8 x 10,3 mm.
- Atorvastatin ratiopharm finns tillgänglig i aluminium/aluminium-blister i förpackningsstorlekarna 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 200 tabletter, och i burkar av högdensitetspolyeten (HDPE) i förpackningsstorlekarna 50 eller 100 tabletter och multipelförpackingar på 100 tabletter (två burkar med 50 tabletter i varje).
- Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg

Tillverkare

Teva Pharma S.L.U., Zaragoza, Spanien
TEVA UK Ltd, Eastbourne, Storbritannien
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polen
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna

Övriga upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ratiopharm Oy
PB 67
02631 Esbo
Tel. 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 2.5.2019.