

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Acyclostad 800 mg tabletti** asikloviiri

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Acyclostad on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Acyclostadia
3. Miten Acyclostadia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Acyclostadin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Acyclostad on ja mihin sitä käytetään**

Asikloviiri kuuluu lääkkeisiin, jotka ovat tehokkaita viruksen aiheuttamia infektioita vastaan (viruslääkkeet).

**Acyclostad 800 mg tabletteja käytetään:**

- Ihon ja limakalvojen Varicella zoster -infektion (vyöruusun) hoidossa potilailla, joiden immuunijärjestelmä toimii normaalisti, kun taudinkulun odotetaan tulevan vakavaksi.

Asikloviiria, jota Acyclostad sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Acyclostadia**

**ÄLÄ käytä Acyclostadia**

- jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Acyclostad 800 mg tabletteja:

- jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai olet iäkkäämpi potilas. Annostusta on silloin muutettava ja sinun pitäisi myös juoda tarpeeksi nestettä hoidon aikana (katso myös kohta 3. *Miten Acyclostadia otetaan*).
- jos sinulla on hermostosairaus.

**Muut lääkevalmisteet ja Acyclostad**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos otat jotakin seuraavista lääkkeistä:

- **interferoni** (käytetään MS-taudin hoitoon), koska molempien lääkkeiden vaikutus saattaa tehostua
- **tsidovudiini** (AIDS-lääke), koska voi ilmaantua hermostohäiriöitä, kouristuksia ja uneliaisuutta
- **teofylliini** (käytetään astman ja muiden hengitysvaikeuksien hoitoon)
- **simeidiini** (käytetään maha- tai pohjukaissuolihaavan hoitoon) ja **probenesidi** (käytetään kihdin hoitoon), koska lääkkeet saattavat suurentaa asikloviirin pitoisuutta
- **mykofenolaattimofetiili** (kudossiirrepotilailla käytettävä lääke). Suuria asikloviiriannoksia käytettäessä on noudatettava varovaisuutta, koska molempien lääkkeiden pitoisuus veressä saattaa suurentua.

### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

#### *Raskaus*

Lääkkeen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin arvioida asikloviirin käytön vaikutuksia raskauteen. Jos olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

#### *Imetys*

Asikloviiri erittyy ihmisen rintamaitoon. Lääkkeen vaikutuksista lapseen ei ole riittävästi tietoa. Jos imetät, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Asikloviirin vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttöön ei tunneta. Joissakin yksittäisissä tapauksissa on kuitenkin todettu väsymystä, päänsärkyä sekä lieviä neurologisia oireita. Nämä tulee ottaa huomioon, jos aiot ajaa autoa tai käyttää koneita hoidon aikana.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkauseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### **Acyclostad sisältää natriumia**

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

## **3. Miten Acyclostadia otetaan**

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti kullekin potilaalle.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Joissakin tapauksissa annostus saattaa poiketa suositellusta annoksesta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Suositteltu annos on**

800 mg viisi kertaa päivässä, eli neljän tunnin välein, kun yöannos jätetään ottamatta. Hoito on aloitettava 48 tunnin sisällä infektion oireiden ilmaantumisesta. Hoidon tulee kestää 7 päivää.

### **Käyttö lapsille**

Lasten vyöruusun hoidosta tällä lääkkeellä ei ole annostustietoja.

### **Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta**

Noudata varovaisuutta, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

Annosta on pienennettävä 800 mg:aan 3 kertaa päivässä noin 8 tunnin välein, jos munuaisten vajaatoiminta on lievä (glomerulussuodosnopeus välillä 15–25 ml/min). Jos munuaisten vajaatoiminta on vakava (glomerulussuodosnopeus alle 10 ml/min), suositellaan annosta 800 mg kahdesti päivässä noin 12 tunnin välein.

## **Iäkkäät potilaat**

Annoksen muuttaminen ei yleensä ole tarpeen iäkkäillä potilailla. Vain tapauksissa, joissa munuaisten toiminta on heikentynyt, lääkäri voi päätyä muuttamaan annostusta.

## **Antotapa**

Tabletit otetaan veden (1/2 lasillista) tai muun nesteen kera.

Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoiminta sekä iäkkäiden potilaiden on huolehdittava riittävästä nesteen saannista asikloviirihoidon aikana. Riittävä nesteen saanti on tärkeää myös potilailla, jotka saavat suuriannoksista asikloviirihoitoa.

## **Jos käytät enemmän Acyclostadia kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen merkkejä ovat maha- ja suolisto-oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja hermosto-oireet kuten päänsärky ja sekavuus.

## **Jos unohdat ottaa Acyclostad-annoksen**

Jos olet vasta hiljattain unohtanut ottaa tabletin, voit heti ottaa sen. Jos tabletin unohtamisesta on jo ehtinyt kulua pitkä aika, jätä tämä annos väliin. Odota, kunnes on aika ottaa seuraava annos ja jatka tämän jälkeen normaalia annostusta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

## **Jos lopetat Acyclostadin käytön**

Lääkäri on määrännyt asikloviirihoidon keston. Älä lopeta hoitoa ennenaikaisesti neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Nämä haittavaikutukset yleensä häviävät hoidon loputtua. Alla on lista mahdollisista haittavaikutuksista.

### **Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä):**

- sekavuus
  - aistiharhat
  - päänsärky, huimaus, uneliaisuus
- Edellä mainittuja, yleensä korjaantuvia haittavaikutuksia esiintyi tavallisesti potilailla, joilla oli munuaistoiminnan häiriöitä tai muita altistavia tekijöitä, mutta niitä ei täysin voida katsoa näistä syistä johtuviksi.
- pahoinvointi
  - oksentelu
  - ripuli
  - vatsakivut
  - kutina
  - ihottuma (mukaan lukien valoherkkyys)
  - väsymys
  - kuume
  - uupumus.

**Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta):**

- unettomuus
- nokkosihottuma
- lisääntynyt hajanainen hiustenlähtö (yhteys hoitoon epäselvä).

**Harvinaiset (enintään 1 potilaalla tuhannesta):**

- vakavat allergiset reaktiot (anafylaksia)
- hengenahdistus
- korjaantuva bilirubiini- ja maksaentsyymitason nousu
- angioedeema
- veren urea- ja kreatiinipitoisuuden nousu.

**Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta):**

- verenkuvan muutokset (anemia, leukopenia, trombosytopenia)
- vierauden tunne (korjaantuu hoidon loputtua), kiihtymys, psykoottiset oireet
- vapina, haparointi, puheen häiriöt, kouristukset, aivosairaudet, tajunnan häiriöt, jopa kooma  
Edellä mainittuja, yleensä korjaantuvia häirtävaikutuksia esiintyi tavallisesti potilailla, joilla oli munuaistoiminnan häiriötä tai muita altistavia tekijöitä, mutta niitä ei täysin voida katsoa näistä syistä johtuviksi.
- maksatulehdus, keltaisuus
- äkillinen munuaisten vajaatoiminta, kipu munuaisissa.

**Häirtävaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset häirtävaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia häirtävaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa häirtävaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla häirtävaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Läkkeiden häirtävaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

**5. Acyclostadin säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä alle 25 °C.

Läkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien läkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

**6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa****Mitä Acyclostad sisältää**

- Vaikuttava aine on asikloviiri. Yksi Acyclostad 800 mg tabletti sisältää 800 mg asikloviiria.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, povidoni, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.

**Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Acyclostad 800 mg tabletti on pitkulainen, valkoinen tabletti, jakouurre molemmilla puolilla.

Pakkauskoot: 35, 50 ja 500 tablettia läpipainoliuskissa, joissa jokaisessa on viisi tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61 118 Bad Vilbel  
Saksa

**Valmistajat**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61 118 Bad Vilbel  
Saksa

Centrafarm Services B.V.  
Nieuwe Donk 9  
4879 AC Etten-Leur  
Alankomaat

LAMP San Prospero S.p.A  
Via Della Pace 25/A,  
41030 San Prospero, Modena  
Italia

Sanico NV  
Veedijk 59  
2300 Turnhout  
Belgia

**Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja**

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike  
PL 1310  
00101 Helsinki

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.2.2020**

## Bipacksedel: Information till användaren

### Acyclostad 800 mg tablett aciclovir

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Acyclostad är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Acyclostad
3. Hur du tar Acyclostad
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acyclostad ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Acyclostad är och vad det används för**

Aciclovir är ett läkemedel mot infektioner förorsakade av virus.

**Acyclostad 800 mg tabletter används:**

- vid behandling av Varicella zoster-infektion (bältros) på hud och slemhinnor hos patienter med normalt immunförsvar i fall där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan förväntas.

Aciclovir som finns i Acyclostad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Acyclostad**

**Använd INTE Acyclostad:**

- om du är allergisk mot aciclovir, valaciclovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

**Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acyclostad 800 mg tabletter:

- om du har nedsatt njurfunktion eller är en äldre patient. Dosen ska då justeras och du ska dricka tillräckligt med vätska under behandlingen (se också avsnitt 3. *Hur du tar Acyclostad*).
- om du har nervsjukdom.

**Andra läkemedel och Acyclostad**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Särskilt viktigt att du talar om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

- **interferon** (används för behandling av multipel skleros) kan effekten öka för något av läkemedlen

- **zidovudin** (läkemedel vid behandling av AIDS) kan rubbningar i nervsystemet, krampanfall och sömnhet förekomma
- **teofyllin** (används för behandling av astma och andra andningsbesvär)
- **cimetidin** (används för att behandla magsår) och **probene cid** (används för behandling av gikt), eftersom dessa ökar koncentration av aciklovir
- **mykofenolatmofetil** (för att dämpa immunförsvaret hos patienter som genomgått transplantation). Försiktighet bör iaktas om du tar höga doser av aciklovir, eftersom blodnivåer av båda läkemedlen kan öka.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

#### *Graviditet*

Det finns inte tillräckligt med information om användningen av läkemedlet under graviditet för att kunna värdera hur användningen av aciklovir påverkar graviditeten. Om du är gravid ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### *Amning*

Aciklovir utsöndras i bröstmjolk. Det finns inte tillräckligt med information om läkemedlets påverkan på det ammande barnet. Om du ammar ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Effekterna av aciklovir på förmågan att framföra fordon eller hantera maskiner är inte känd. I vissa, enstaka fall har dock trötthet, huvudvärk och lindriga neurologiska symtom rapporterats vilket du bör beakta om du tänker köra bil eller använda maskiner under behandlingen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Acyclostad innehåller natrium**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## **3. Hur du tar Acyclostad**

Läkaren ordinerar den lämpliga dosen individuellt för varje patient.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. I vissa fall kan dosen vara avvikande från den rekommenderade dosen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Rekommenderad dos är**

800 mg 5 gånger dagligen, d.v.s. var 4:e timme då nattdosen lämnas bort. Behandlingen bör inledas inom 48 timmar efter att symtomen på infektionen har yppat sig. Behandlingen ska pågå i 7 dagar.

### **Användning för barn**

Uppgifter om dosering vid behandling av bältros hos barn saknas.

### **Patienter med nedsatt njurfunktion**

Försiktighet rekommenderas när aciklovir ges till patienter med nedsatt njurfunktion.

Dosen ska minskas till 800 mg 3 gånger dagligen cirka var 8:e timme för patienten som har lindrig njursvikt (kreatininclearance mellan 10–25 ml/min). Om patienten har allvarlig njursvikt

(kreatininclearance under 10 ml/min) rekommenderas en dos på 800 mg två gånger dagligen cirka var 12:e timme.

### **Äldre patienter**

En justering av dosen är i allmänhet inte nödvändig för äldre patienter. Endast i fall där njurfunktionen är nedsatt kan läkaren besluta att ändra doseringen.

### **Administreringsätt**

Tabletterna tas tillsammans med vatten (½ glas) eller någon annan vätska.

Patienter med nedsatt njurfunktion samt äldre patienter ska se till att de dricker tillräckligt med vätska under aciklovirbehandlingen. Detta är viktigt också för patienter som får höga doser av aciklovir.

### **Om du har tagit för stor mängd av Acyclostad**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptom för överdosering är verkningar på mage och tarmsystem som illamående, kräkningar och verkningar på nervsystem som huvudvärk och konfusion.

### **Om du har glömt att ta Acyclostad**

Om du helt nyligen har glömt att ta tabletten kan du ta den genast. Om det redan är en längre tid sen du glömde tabletten, ska du inte mera ta denna dos. Vänta tills det är dags för att ta nästa dos och fortsätt sedan den normala doseringen. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

### **Om du slutar att ta Acyclostad**

Läkare har bestämt hur länge behandlingen ska pågå. Avbryt inte behandlingen för tidigt utan att först konsultera med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa biverkningar försvinner vanligen efter behandlingen. Nedan finns en lista på biverkningar som möjligen kan förekomma under behandlingen.

### **Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):**

- förvirring
  - hallucinationer
  - huvudvärk, yrsel, dåsighet
- Ovan nämnda vanligen reversibla biverkningar sågs oftast hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter med anlag för dessa biverkningar men samband med behandlingen är oklar.
- illamående
  - kräkningar
  - diarré
  - buksmärta
  - klåda
  - hudutslag (inkl. ljuskänslighet)
  - trötthet
  - feber
  - utmattning.

### **Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):**



- sömnlöshet
- nässelutslag
- diffust håravfall (samband med behandlingen är oklar).

**Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):**

- allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi)
- andningssvårigheter (dyspné)
- övergående ökning av bilirubin och leverenzzymer
- angioödem
- ökning av halten urea och kreatinin i blodet.

**Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):**

- förändrade blodvärden (anemi, leukopeni, trombocytopeni)
  - känsla av främlingskap (försvinner efter behandlingen), rastlöshet, psykotiska symtom
  - diarrningar, koordinationssvårigheter, talsvårigheter, kramper, hjärnsjukdom (encefalopati), sänkt medvetandegrad ner till koma
- Ovan nämnda vanligen reversibla biverkningar sågs oftast hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter med anlag för dessa biverkningar men samband med behandlingen är oklar.
- hepatit, gulsot
  - akut njursvikt, njursmärta.

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

**5. Hur Acyclostad ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

**Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är aciklovir. Varje Acyclostad 800 mg tablett innehåller 800 mg aciklovir.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Acyclostad 800 mg tablett är en vit, avlång tablett med skåra på båda sidor.

Förpackningar: 35, 50 och 500 tabletter i blisterförpackningar som innehåller 5 tabletter i en blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61 118 Bad Vilbel  
Tyskland

**Tillverkare**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61 118 Bad Vilbel  
Tyskland

Centrafarm Services B.V.  
Nieuwe Donk 9  
4879 AC Etten-Leur  
Nederländerna

LAMP San Prospero S.p.A  
Via Della Pace 25/A,  
41030 San Prospero, Modena  
Italien

Sanico NV  
Veedijk 59  
2300 Turnhout  
Belgien

**Lokal företrädare**

STADA Nordic ApS, filial i Finland  
PB 1310  
00101 Helsingfors

**Denna bipacksedel ändrades senast 25.2.2020**