

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Dicломex Rapid 50 mg kalvopäällysteiset tabletit diklofenaakkikalium

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Dicломex Rapid on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Dicломex Rapidia
3. Miten Dicломex Rapidia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dicломex Rapidin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dicломex Rapid on ja mihin sitä käytetään

Dicломex Rapid sisältää vaikuttavana aineena diklofenaakkikaliumia, joka tehoaa **kipuun** (toimii kipulääkkeenä) ja **tulehdusreaktioihin** (on ns. anti-inflammatoryinen lääke). Tällaisia ominaisuuksia omaavat lääkkeet kuuluvat ns. ei-steroidirakenteisten **tulehduskipulääkkeiden** (eli NSAID-lääkkeiden) ryhmään.

Dicломex Rapid-tabletteja käytetään seuraavien tilojen lyhytaikaiseen hoitoon:

- reumaattiset pehmytkudossairaudet (kuten limapussin tulehdus tai jännetulehdus)
- loukkaantumisen tai leikkauksen jälkeinen kipu ja tulehdus (mukaan lukien hammaskirurgiset toimenpiteet)
- kuukautiskivut (ns. primaarinen dysmenorrea).

Lisäksi Dicломex Rapidia määritään sekä ilman ennakkooireita että ennakkooireiden kanssa ilmenevän migreenin kohtauslääkkeeksi.

Dicломex Rapid -lääkettä ei tule käyttää alle 16-vuotiaiden lasten hoidossa.

Diklofenaakkia, jota Dicломex Rapid sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Dicломex Rapidia

Älä käytä Dicломex Rapidia

- jos epäilet olevasi allerginen diklofenaakkille, asetyylialisyylihapolle, ibuprofeenille, jollekin muulle tulehduskipulääkkeelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Yliherkkysreaktion oireita voivat olla kasvojen tai suun alueen turvotus (angioedeema), hengitysvaikeudet, rintakivut, vuotava nuha, ihottumat tai muut allergiaan viittaavat reaktiot.
- jos sinulla on mahahaava tai pohjukaissuolen haava, verenvuotoa tai puhkeama.
- jos sinulla on aikaisemmin ollut ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai ruoansulatuskanavan puhkeama aiemmasta tulehduskipulääkkeiden käytöstä.
- jos sinulla on ollut mahahaava tai mahalaukun verenvuoto vähintään kahdesti.

- jos olet raskaana viimeisellä kolmanneksella.
- jos sinulla on vaikea munuais- tai maksasairaus.
- jos sinulla on sydänsairaus ja/tai aivoverisuonisairaus, esimerkiksi jos sinulla on ollut sydänkohtaus, aivohalvaus, ns. TIA-kohtaus (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö) tai sydän- tai aivoverisuonten tukos tai jos sinulle on tehty toimenpide tai leikkaus verisuonitukoksen poistamiseksi tai ohittamiseksi.
- jos sinulla on tai on ollut verenkierto-ongelma (ääreisvaltimosairaus).
- jos sinulla on maksaporfyria (tietynlainen hemoglobiinin muodostumiseen liittyvä häiriö).
- jos sinulla on jokin **veren muodostumiseen liittyvä häiriö tai verenvuototaipumus**.
- jos sinulla on ollut joskus allerginen reaktio kuten astmakohtaus, nuhaa tai ihottumaa otettuasi asetyylialisyylihappoa sisältäviä särkylääkkeitä tai muita tulehdukseen tai kipun käytettäviä tulehduskipulääkkeitä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Diclofenex Rapid-lääkettä

- jos olet äskettäin läpikäynyt tai piakkoin menossa mahan tai suoliston alueen **leikkaukseen**, sillä diklofenaakki voi joskus heikentää suolistohaavojen paranemista leikkaustoimenpiteiden jälkeen
- jos sinulla on **keuhkoastma** (hengitystiesairaus johon liittyy hengenahdistusta), kausiluontoinen allerginen nuha, turvonneet limakalvot nenässä, jokin krooninen keuhkosairaus tai hengitystieinfektio
- jos sinulla on veren hyytyminishäiriötä
- jos sinulla on munuaisten toimintähäiriö
- jos sinulla on **merkittävä nestehukka** (esim. ennen tai jälkeen suurehkon leikkaustoimenpiteen)
- jos sinulla on jokin maksan toimintähäiriö
- jos sinulla on **haavainen paksusuolen tulehdus** tai **Crohnin tauti** (tietty suolistosairaus)
- jos olet tavallista alttiimpi saamaan infektioita
- jos tupakoit
- jos sinulla on diabetes
- jos sinulla on rasitusrintakipuja, verisuonitukos, korkea verenpaine, kohonnut kolesteroli- tai triglyseridiarvo.

Lääkkeen haittavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä **pienintä tehokasta annosta** ja lyhyimmän mahdollisen ajan.

Minkä tahansa särkylääkkeen pitkittynyt käyttö päänsäryyn hoitoon voi muuttaa oireita pahemaksi. Jos sinulla on tai epäilet sinulla olevan tällainen tila, hakeudu lääkärin hoitoon ja keskeytä lääkitys.

Laboratoriokokeet

Jos käytät Diclofenex Rapidia pidemmän aikaa, lääkäri tarkistaa maksa- ja veriarvosi sekä munuaistesit toiminnan säännöllisin välein.

Ruoansulatuskanavan verenvuodot, haavaumat ja puhkeamat

Minkä tahansa ei-steroidirakenteisen tulehduskipulääkkeen (NSAID-lääkkeen) käyttö voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan verenvuotoja, haavaumia ja puhkeamia. Nämä voivat jopa olla kuolemaan johtavia. Tällaisten haittavaikutusten ilmaantuminen on tavallista todennäköisempää, jos

- käytetään suurehkoja NSAID-annoksia
- lääkkeen käyttäjällä on ilmennyt haavaumia jo aiemmin, ja etenkin, jos näihin on liittynyt verenvuotoa tai suiston puhkeamia
- lääkkeen käyttäjä on jo vähän jäkkäämpi.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua ja/tai jos lisäksi käytät

- pieniannoksista **asetyylialisyylihappohoittoa** veren hyytymisen estämiseksi tai
- muita ruoansulatuskanavaan liittyvien häiriöiden riskiä lisääviä lääkkeitä,

lääkäri voi määräätä sinulle **ruoansulatuselimistöäsi suojaavaa lääkitystä Diclofenex Rapidin lisäksi**.

Jos sinulla **aiemmin on ilmennyt ruoansulatuselimistöön liittyviä haittavaikutuksia**, sinun on kerrottava lääkärille kaikista mahdollisista vatsaan liittyvistä poikkeavista oireista. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla ilmenee maha- tai suolistoverenvuotoa. Tällaiset verenvuodot voit havaita, jos oksennat verta tai jos ulosteesi väri muuttuu mustaksi. Verenvuotojen riski on tavallista suurempi iäkkäillä potilailla.

Jos sinulla ilmenee ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai haavaumia Diclofenac Rapid -lääkityksen aikana, on tämä lääkehoito keskeytettävä.

Vaikutukset sydämeen, verenkiertotoimintaan ja aivoverenkiertoon

Diclofenac Rapidin kaltaisten lääkkeiden käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydänkohtauksen (sydäminfarktin) tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa.

Ihoreaktiot

Tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä on hyvin harvoissa tapauksissa ilmoitettu vakavia, joskus jopa kuolemaan johtaneita ihoreaktioita **punoituksen ja rakkulanmuodostuksen** kera. Jos sinulla ilmenee **ihoon tai limakalvoihin liittyviä oireita**, sinun on **keskeytettävä** Diclofenac Rapidin käyttö ja ilmoitettava tapahtuneesta lääkärille heti ensioireiden ilmetessä. Tämä koskee myös mahdollisia yliherkkyyteen viittaavia oireita (ks. lisäksi kohta 4.).

Iäkkääät potilaat

Iäkkällä ja hauralla iäkkällä potilailla tulehduskipulääkkeiden käyttö aiheuttaa **haittavaikutuksia keskimääräistä useammin**. Tämä koskee etenkin mahalaukun ja suoliston verenvuotoja ja puhkeamia, jotka joskus saattavat olla jopa potilaan henkeä uhkaavia.

Lapset ja nuoret

Alle 16-vuotiaat lapset **eivät** saa käyttää Diclofenac Rapid 50 mg -tabletteja.

Muut lääkevalmisteet ja Diclofenac Rapid

Kerro lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käytänyt tai saatat ottaa muita lääkeitä.

Älä käytä Diclofenac Rapidia, jos käytät samanaikaisesti:

- **muita** ei-steroidirakenteisten **tulehduskipulääkkeiden** (NSAID-lääkkeiden) ryhmään kuuluvia kipua tai tulehdusta lievittäviä lääkeitä
- **COX-2-estäjiä** (toinen tulehdustiloja lievittävien lääkkeiden ryhmä)
- **glukokortikoideja** (toinen tulehdusta lievittävien lääkeaineiden ryhmä)

Lääkäri arvioi edellä mainittujen lääkkeiden käyttöä tapauskohtaisesti.

Erityiseen varovaisuuteen on syytä, jos käytät Diclofenac Rapidia yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa:

- **digoksiini** (sydämen voimaa ja suorituskykyä lisäävä lääke)
- **litium** (mielenterveys-/tunnetilojen häiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke)
- **nesteen kertymistä estävät lääkkeet** (diureetit, eli nesteenpoistolääkkeet)
- lääkkeet, jotka nostavat kaliumpitoisuutta veressä
- **verenpainelääkkeet, kuten beetasalpaajat, ACE:n estäjät ja angiotensiini II - reseptoriantagonistit** (sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja verenpaineen alentamiseksi käytettäviä lääkeitä)
- tietyt **masennuslääkkeet** (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, ns. SSRI-lääkkeet)
- **metotreksaatti** (toinen reumasairauksien hoidossa käytettävä lääke)
- **antikoagulantit** (veren hyytymistä estävät lääkkeet), kuten varfariini
- **siklosporiini** (heikentää elimistön omia puolustusmekanismeja)
- **verensokeria alentavat lääkkeet** (diabeteslääkkeet)
- **kinoloniryhmän antibiootit** (bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon)
- **kolestipoli/kolestyramiini** (veren rasvapitoisuutta alentava lääkeet).
- **fentyttiini** (kouristusohtauksen hoitoon käytettävä lääke)
- **vorikonatsoli** (sieni-infektioiden hoitoon tarkoitettu lääke)
- **sulfiinipyratsoni** (kihdin hoitoon käytettävä lääke)

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos ole raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekrista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä Dicломex Rapidia **viimeisellä raskauskolmanneksella**, sillä se voi vahingoittaa syntymätöntä lasta tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Valmiste voi aiheuttaa munuais- ja sydänongelmaa syntymättömälle lapselle. Se voi vaikuttaa sinun ja vauvasi verenvuototaipumukseen ja viivästyttää tai pitkittää synnyystä.

Älä ota Dicломex Rapidia **raskauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja ellei lääkäri kehota ottamaan sitä.** Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Dicломex Rapidia käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikolla tai sen jälkeen, se voi aiheuttaa syntymättömälle lapselle munuaisongelmia, joka voi johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden määrään vähennemiseen (oligohydramnion) tai tietyn verisuonien (valtimotiehyen) kuroumaan vauvan sydämessä. Jos tarvitset hoitoa pidempään kuin muutaman päivän ajan, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.

Imetyks

Tämän lääkevalmisten vaikuttavan aineen (diklofenaakin) tiedetään erityyväni ihmisen rintamaitoon pieninä määrinä. Näin ollen Dicломex Rapid 50 mg -tabletteja ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Naisten hedelmällisyys

Muiden prostaglandiinisynteesiä (tiettyjen kudoshormonien syntyä) estävien lääkkeiden tavoin Dicломex saattaa vaikeuttaa raskaaksi tuloa. Kerro lääkärlle, jos suunnittelet raskautta tai jos sinulla on ollut vaikeuksia tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dicломex Rapid saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten näköhäiriötä, pyörryystä, huimautta, ja uneliaisuutta. Tästä syystä reaktiokykysi saattaa muuttua ja lääke voi heikentää kykyäsi kuljettaa moottoriajoneuvoa tai käyttää tarkkuutta vaativia koneita.

Dicломex Rapid sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisten ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten Dicломex Rapidia käytetään

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkärliltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Antotapa

Ota Dicломex Rapid -tablettisi **pienen nestemäärän kera, mieluiten ennen ateriaa. Älä pureskele tabletteja.**

Hoidon kesto

Lääkäri päättää miten kauan sinun tulee käyttää Dicломex Rapidia.

Suositeltu annos on

Aikuiset ja yli 16-vuotiaat nuoret:

Aloitussannos on yleensä 2 - 3 Dicломex Rapid 50 mg -tablettia vuorokaudessa. Lievissä tapauksissa 1 - 2 tablettia vuorokaudessa on useimmiten riittävä annos. Vuorokausiannos on jaettava 2 - 3 osa-annokseen.

Kuukautiskivut:

1 - 3 Dicломex Rapid 50 mg -tablettia jaettuna 1 - 3 osa-annokseen vuorokaudessa. Annostusta on sovitettava yksilöllisen tarpeen mukaan. Hoito aloitetaan pienehköllä annoksella (1 - 2 tablettia vuorokaudessa), jota sitten asteittain voidaan lähteä suurentamaan kuukautisista seuraaviin. Hoito aloitetaan ensimmäisten kipuoireiden ilmaantuessa, ja sitä jatketaan muutaman päivän ajan kivun vaikeusasteesta riippuen.

Migreeni:

Yksi Dicломex Rapid 50 mg -tabletti heti alkamassa olevan kohtauksen ensioireiden ilmaantuessa. Jos riittävä kivunlievitystä ei ole saavutettu kahdessa tunnissa ensimmäisen tabletin otosta, voidaan ottaa toinen tabletti. Kohtauksen jatkuessa Dicломex Rapid 50 mg -tabletteja voi ottaa 4 - 6 tunnin välein.

Älä ota yli 4 Dicломex Rapid 50 mg -tablettia vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Dicломex Rapid -valmistetta ei saa käyttää alle 16-vuotiaiden lasten hoitoon.

Jos otat enemmän Dicломex Rapidia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkärin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Dicломex Rapidia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseen unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava tabletti sen normaalina ottoajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutusten ilmaantuvuus riippuu yleisesti ottaen käytetyn annoksen suuruudesta, ja haittavaikutukset vaihtelevat potilaasta toiseen. Etenkin ruoansulatuskanavan verenvuotojen (haavaumat, limakalvovauriot, mahalaukun limakalvon tulehdus) esiintyvyys riippuu käytetystä annoksesta sekä hoidon kestosta.

Vakavat haittavaikutukset ja niiden vaativat toimenpiteet

Lopeta Dicломex Rapidin käyttö ja kerro lääkärille heti, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista

- Nopeutunut syke ja sokkiin johtava verenpaineen lasku (merkkejä vakavasta yliherkkyyssreaktiosta). Tätä voi ilmetä jo ensimmäisellä käyttökerralla, joskin harvoin.
- Kasvojen, hulutten, suun, kielen tai nielun turvotus, johon voi liittyä nielemis- tai hengitysvaikeuksia (ns. angioedeema). Tällaiset reaktiot ovat hyvin harvinaisia.
- Vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien rakkulanmuodostus, punaiset tai purppuranväriset jäljet, tai ihmisen kuoriutuminen. Näitä saattaa esiintyä myös suussa, silmissä ja muilla limakalvoilla (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai erythema multiforme). Näitä reaktioita ilmenee hyvin harvoin.
- Vaikeat **ylävatsakivot**, oksentelu, verinen oksentelu, veriripuli ja mustat ulosteet (merkkejä ruoansulatuskanavan verenvuodosta tai haavaumista). Tämä on harvinaista.
- **Vatsan alueen lievät kouristukset ja arkuus**, jotka alkavat pian Dicломex Rapid - hoidon aloituksen jälkeen, sekä verenvuoto peräsuolesta tai veriripuli yleensä 24 tunnin kuluessa vatsakipujen alkamisesta (esiintymistihyyttä ei tiedetä, koska sitä ei voi arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella).
- **Pinnalliset haavaumat** suussa, kuumi, kurkkukipu, nenäverenvuodot ja mustelmat, influenssan kaltaiset oireet, vaikka uupumus (merkkejä verisolujen muodostumiseen liittyvistä häiriöistä, tiettyjen verisolujen määrän vähennyminen). Näitä ilmenee hyvin harvoin. Älä käytä kipulääkeitä tai muita lääkeitä kuumeen alentamiseksi.
- Kova **päänsärky**, pahoinvointi, oksentelu, **kuume**, niskajäykkyys tai tajunnan hämärtyminen (aivokalvontulehduksen merkkejä). Tätä ilmenee hyvin harvoin.

- **Vähentypty virtsaneritys**, nesteen kertyminen elimistöön ja yleinen huonovointisuus (merkkejä munuaisiin liittyvistä vaivoista tai munuaisten vajaatoiminnasta). Tätä esiintyy hyvin harvoin.

Jos sinulla ilmenee seuraavaa, ota **yhteys lääkäriin** mahdollisimman pian:

- **Urtikaria** (nokkosrokko, eli vaalean punertava, kohollaan oleva, kutiava ja nystyräinen ihottuma). Tämä on harvinainen reaktio.

Muut haittavaikutukset

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä Diclofenac Rapid -hoidon aikana:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- Päänsärky ja huimaus
- pyörryttävä tunne (ns. vertigo, eli kiertohuimaus)
- ylävatsakivut, pahoinvoimi, oksentelu, ripuli, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, ruokahaluttomuuus
- kohonneet maksentsyymipitoisuudet veressä
- ihottumat ja ihoärsytys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

- väsymys, uneliaisuus
- vinkuva hengitysäni ja hengenahdistus (astma)
- häiriöt maksan toiminnassa, mukaan lukien hepatiitti (maksatulehdus) kellertävän ihmisen ja silmävalkuisten kera tai ilman täitä oiretta
- mahalaukun limakalvon tulehdus, maha- ja pohjukaissuolihaavaumat (mahdollisesti verenvuodon ja puhkeaman kera)
- nesteen kertyminen elimistöön, oireena voi olla esim. turvonneet nilkat (ödeema).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

- henkiset/tunne-elämään liittyvät häiriöt, masennus, ahdistuneisuus, painajaisunet
- hahmotukseen ja muistamiseen liittyvät häiriöt, normaalina ajan ja paikantajun hämärtyminen, unettomuus, ärtvyys, kouristelut, vapina
- makuaistimusten muutokset
- sormien pistely ja puutuminen
- näköhäiriöt (näön hämärtyminen tai kaksoiskuvien näkeminen)
- korvien soiminen ja heikentyt kuulo
- nopeat tai epäsäännölliset sydämenlyönnit (sydämentykytys), rintakivut, sydämen vajaatoiminta, sydäninfarkti, korkea verenpaine
- verisuonitulehdus (vaskuliitti)
- keuhkotulehdus (pneumoniitti)
- alavatsaoireet ja suoliston loppupään oireet, kuten suolistoverenvuodot ja -tulehdut, Crohnin taudin tai haavaisen paksusuolentulehdusen pahaneminen
- suun tai kielen tulehdus, ruokatorven vauriot, ummetus
- haimatulehdus
- hyvin ärhäästi etenevä hepatiitti B (maksatulehdus) ja vaikeat maksan toimintahäiriöt
- pienet ihonalaiset verenvuodot (ns. purppura, täitä aiheuttavat myös allergiat), ihottuma, ekseema, valoherkkyys, ihmisen punoitus ja kutina
- hiusten lähtö
- aikuutit munuaisten toimintahäiriöt, valkuaisvirtsaisuus, verta virtsassa, nefroottinen oireyhtymä (nesteen kertyminen elimistöön ja merkitsevä valkuaisen erittyminen virtsaan), munuaisten kudosvauriot
- erekton saantivaikeudet (impotenssi).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

- rintakivut, jotka saattavat olla merkinä mahdollisesti vakavasta allergisesta reaktiosta, ns. aikuistista koronaarioireyhtymästä. Käännyn heti lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee rintakipua.

- Diclofenac Rapidin kaltaisten lääkkeiden käyttöön voi mahdollisesti liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Haittavaikutsista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutsista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutsista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Diclofenac Rapidin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä ulkopakkauksessa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Diclofenac Rapid sisältää

- Vaikuttava aine on diklofenaakkikalium. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg diklofenaakkikaliumia.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, maissitarvikkelys, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, hypromelloosi, glyseroli 85 %, titaanidioksidi (E 171), talkki sekä punainen ja keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Punaruskea, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, halk. 11,1 mm.

Pakkauskoot:

10, 20, 20x1, 30, 50, 50x1, 100 ja 100x1 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Saksa

Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.2.2023

Bipacksedel: Information till användaren

Dicломex Rapid 50 mg filmdragerade tabletter diklofenakkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Dicломex Rapid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dicломex Rapid
3. Hur du använder Dicломex Rapid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dicломex Rapid ska förvaras
6. Förfäckningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dicломex Rapid är och vad det används för

Dicломex Rapid innehåller den aktiva substansen diklofenakkalium med effekt mot **smärta** (smärtstillande medel) och **inflammationstillstånd** (ett antiinflammatoriskt medel). Läkemedel med denna typ av effekt tillhör gruppen icke-steroida smärtstillande medel (s.k. **NSAID-läkemedel**).

Dicломex Rapid används för korttidsbehandling av följande tillstånd:

- reumatiska sjukdomar i mjukdelar (som t.ex. bursit, d.v.s. slemsäcksinflammation, eller seninflammation)
- smärta eller inflammation till följd av skada eller operationer (inklusive tandkirurgiska ingrepp)
- menstruationssmärtor (s.k. primär dysmenorré).

Dicломex Rapid ordinaras även för akut behandling av migrän med eller utan aura.

Dicломex Rapid är inte avsett för behandling av barn under 16 år.

Diklofenak som finns i Dicломex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dicломex Rapid

Använd inte Dicломex Rapid

- om du tror att du kan vara allergisk mot diklofenak, acetylsalicylsyra, ibuprofen, något annat läkemedel ur gruppen icke-steroida antiinflammatoriska smärtstillande medel (NSAID), eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på överkänslighetsreaktioner kan vara svullnad i ansikte och mun (angioödem), andningssvårigheter, bröstsmärter, rinnnsnuva, hudutslag och andra typer av allergiska reaktioner.
- om du har sår i magsäcken eller tolvfingertarmen, blödning i magtarmkanalen eller perforation
- om du har haft blödning/perforation i mage eller tarm i samband med tidigare användning av smärtstillande läkemedel (NSAID-preparat)

- om du vid två eller flera tillfällen har haft sår eller blödningar i magsäcken
- under de sista tre månaderna av graviditeten
- om du har svårt nedsatt lever- eller njurfunktion
- om du har en konsaterad hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. om du har haft en hjärtinfarkt, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA) eller förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation
- om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)
- om du har hepatisk porfyri (en särskild hemoglobinbildningssjukdom)
- om du har **störningar i blodbildning** eller **ökad blödningsbenägenhet**
- om du tidigare har fått en allergisk reaktion, som t.ex. astmaattacker, nysningar eller hudutslag vid användning av acetylsalicylsyra (ASA) eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Diclofenac Rapid

- om du nyligen genomgått, eller snart ska genomgå en operation i mage eller tarm, eftersom diklofenak i vissa fall kan fördröja sårläkningen i tarmarna
- om du har **lungasthma** (sjukdom i andningsvägarna, vilken orsakar andnöd), säsongsbunden allergisk snuva, svullnad av slemhinnorna i näsan, kronisk lungsjukdom eller luftvägsinfektion
- om du har en blodkoagulationssjukdom
- om du nedsatt njurfunktion
- om du har **förlorat mycket vätska** (t.ex. före eller efter en större operation)
- om du har en leversjukdom
- om du har **ulcerös kolit** eller **Crohns sjukdom** (en viss tarmsjukdom)
- om din infektionsrisk är ökad
- om du röker
- om du har diabetes
- om du har kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck, höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter).

Biverkningar kan minskas genom att använda **lägsta effektiva dos** under kortast möjliga tid som behövs för att kontrollera symtomen.

Långvarig användning av alla typer av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Vid känd eller misstänkt läkemedelsutlöst huvudvärk bör patienten söka medicinsk hjälp och behandlingen avbrytas.

Laboratorieprov

När du tar Diclofenac Rapid under en lång tid kommer din läkare att regelbundet kontrollera dina levervärden, din njurfunktion och ditt blodvärde.

Blödningar, sår och perforationer i mag-tarmkanalen

En behandling med vilket NSAID-läkemedel som helst kan orsaka blödningar i mag-tarmkanalen, sår eller perforation, eventuellt med dödlig utgång. Risken för dessa biverkningar är större

- ju större NSAID-dos som används
- hos patienter som redan tidigare haft magsår, särskilt om dessa inkluderat blödning eller perforation
- hos äldre patienter

Om du har en av dessa riskfaktorer och/eller om du dessutom behandlas med

- låg dos **acetylsalicylsyra** (ASA) som blodförtunnande medel eller
- andra läkemedel som ökar risken för sjukdom i mag-tarmkanalen

kan din läkare eventuellt ordnara dig **ett läkemedel som skyddar magen** som tillägg till Diclofenac Rapid.

Om du **tidigare har haft biverkningar från mag-tarmkanalen** ska du rapportera alla ovanliga magsymtom till din läkare. Detta gäller särskilt blödning från mage eller tarm. En sådan blödning känns igen på svartfärgad kräkning eller avföring. Särskilt löper äldre patienter en ökad risk för dessa biverkningar.

Om du har blödning eller sår i mag- och tarmkanalen när du tar Diclofenac Rapid, måste behandlingen avbrytas.

Effekter på blodkärlen i hjärtat och hjärnan

Ett bruk av den typ av läkemedel som Diclofenac Rapid tillhör kan vara förknippat med en lätt ökning av risken för hjärtinfarkt eller hjärnslag. Riskerna ökar vid höga doser och vid långvarigt bruk. Använd inte Diclofenac Rapid i högre doser eller längre perioder än ordinarerat.

Hudreaktioner

I samband med bruk av NSAID-läkemedel har mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner med **hudrodnad och blåsor** rapporterats. Dessa reaktioner har ibland haft dödlig utgång. **Sluta ta Diclofenac Rapid och kontakta omedelbart läkare** vid första eventuella tecken på **reaktioner i hud eller slemhinnor**. Detta gäller också tecken på överkänslighetsreaktioner (se även avsnitt 4).

Äldre patienter

Biverkningar förekommer **oftare** hos äldre eller fysiskt svaga äldre patienter som tar NSAID-preparat. Detta gäller speciellt blödningar och perforationer av mag-tarmkanalen, vilka i vissa fall kan vara livshotande.

Barn och ungdomar

Diclofenac Rapid 50 mg får **inte** användas av barn under 16 år.

Andra läkemedel och Diclofenac Rapid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Diclofenac Rapid samtidigt som:

- **andra** antiinflammatoriska smärtstillande medel (**NSAID**-läkemedel)
- **COX-2 hämmare** (en annan typ av antiinflammatoriska medel)
- **glukokortikosteroider** (antiinflammatoriska läkemedel).

Din läkare avgör detta från fall till fall.

Särskild försiktighet krävs när Diclofenac Rapid tas med:

- **digoxin** (läkemedel som ökar hjärtats styrka och slagkraft)
- **litium** (för behandling av mentala/emotionella besvär)
- läkemedel som **verkar mot vätskeansamling** (diureтика, d.v.s. urindrivande medel)
- läkemedel som ökar kaliumnivåerna i blodet
- **blodtryckssänkande läkemedel inklusive betablockerare, ACE-hämmare och angiotensin II-receptor hämmare** (läkemedel för behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck)
- vissa **läkemedel mot depression** (selektiva serotoninåterupptagshämmare, d.v.s. SSRI-läkemedel)
- **metotrexat** (ett annat läkemedel mot reumatism)
- **blodförtunnande** läkemedel såsom warfarin (för att hindra blodproppar)
- **ciklosporin** (hämmar kroppens immunförsvar)
- **blodsockersänkande** läkemedel (läkemedel för behandling av diabetes)
- **kinolonantibiotika** (ett läkemedel mot bakteriella infektioner)
- **kolestipol/kolestyramin** (för sänkande av blodfettvärdena)
- **fenytoin** (läkemedel för behandling av krampanfall/epilepsi)
- **vorikonazol** (läkemedel mot svampinfektioner)
- **sulfinpyrazon** (läkemedel mot gikt).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

Graviditet

Ta inte Diclofenac Rapid under graviditetens 3 sista månader eftersom det kan skada ditt ofödda barn eller orsaka problem vid förlossningen. Det kan orsaka njur- och hjärtproblem hos ditt ofödda barn. Det kan

påverka din och ditt barns benägenhet att blöda och göra att förlossningen försenas eller tar längre tid än förväntat.

Du ska inte ta Diclofenac under graviditetens första 6 månader om det inte är absolut nödvändigt och ser på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under denna period eller medan du försöker bli gravid ska lägsta möjliga dos användas under kortast möjliga tid. Från och med 20:e graviditetsveckan kan Diclofenac orsaka njurproblem hos ditt ofödda barn om det tas under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer av fostervattnet som omger barnet (oligohydramnios) eller till förträngning av ett blodkärl (*ductus arteriosus*) i barnets hjärta. Om du behöver längre behandling än några dagar kan din läkare rekommendera ytterligare övervakning.

Amning

Den aktiva substansen, diklofenak, passerar i små mängder över i modersmjölk. Diclofenac får därför inte användas under amning.

Fertilitet hos kvinnor

Liksom övriga läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen (uppkomsten av vissa vävnadshormoner), kan Diclofenac göra det svårare att bli gravid. Tala om för läkaren om du planerar att bli gravid eller om du har haft problem att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Diclofenac kan orsaka biverkningar som synstörningar, svindel och yrsel, sömnighet och dåsighet. Som ett resultat kan din reaktionsförmåga förändras och din förmåga att köra bil och använda maskiner försämras.

Diclofenac innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Diclofenac Rapid

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Administreringssätt

Ta Diclofenac Rapid **tillsammans med en liten mängd vätska, helst före måltid. Tugga inte på tabletterna.**

Behandlingstid

Läkaren avgör hur länge du bör använda Diclofenac Rapid.

Rekommenderad dos

Vuxna och ungdomar över 16 år:

Startdosen är vanligen 2-3 Diclofenac Rapid 50 mg tablett per dag. I lindriga fall är i allmänhet en dos på 1-2 tablett/dygn tillräckligt. Dygnsdosen ska fördelas på 2-3 deldosar.

Menstruationssmärta:

Totalt 1-3 tablett Diclofenac Rapid 50 mg per dygn, fördelat på 1-3 deldosar. Dosen bör justeras individuellt. Behandlingen bör inledas med en lägre dos på 1-2 tablett per dag. Denna startdos kan sedan gradvis ökas från en menstruation till följande.

Behandlingen ska påbörjas när de första tecknen på smärta observeras och sedan fortsättas i några dagars tid, beroende på smärtans intensitet.

Migrän:

Ta 1 tablett Dicломex Rapid 50 mg vid de första tecknen på en migränattack. Om tillräcklig smärtlindring inte uppnåts inom två timmar efter den första tabletten, kan ytterligare en tablett tas. Vid behov kan ytterligare Dicломex Rapid 50 mg tabletter tas med 4-6 timmars mellanrum.

Ta aldrig mer än 4 tabletter Dicломex Rapid 50 mg per dygn.

Användning för barn och ungdomar

Dicломex Rapid 50 mg lämpar sig inte för behandling av barn under 16 år.

Om du använt för stor mängd av Dicломex Rapid

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Dicломex Rapid

Ta inte dubbla doser för att kompensera för de doser du glömt. Ta följande tablett först då du normalt borde ta den.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är i regel dosberoende och varierar från patient till patient. Särskilt risken för blödning i mag-tarmkanalen (sår, skador på slemhinnor, inflammation i magsäckens slemhinna) beror på dosintervallet och behandlingstiden.

Allvarliga biverkningar och motåtgärder

Sluta använda Dicломex Rapid och tala genast om för din läkare om du märker av följande:

- Ökad hjärtfrekvens, ett blodtrycksfall med chock (tecken på allvarliga överkänslighetsreaktioner). Detta kan inträffa när man tar Dicломex Rapid för första gången, men det är sällsynt.
- Svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem). Detta är mycket sällsynt.
- Allvarliga hudreaktioner med blåsor, röda eller lila märken eller flagning av huden. Det kan också påverka mun, ögon och andra slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller Erythema multiforme). Detta är mycket sällsynt.
- Svår **smärta i övre delen av buken**, kräkning, blodblandad kräkning, blodblandad diarré och svartfärgad avföring (tecken på mag/tarm blödning eller magsår). Detta är sällsynt.
- **Lätt kramp och ömhet i magen**, som börjar kort efter behandlingsstarten med Dicломex Rapid och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärter uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).
- **Ytliga sårnader** i munnen, feber, halsont, näsblödning och blåmärken, influensaliknande symtom, svår utmattning (tecken på störningar i bildningen av blodkroppar, sänkt antal av vissa blodkroppar). Detta är mycket sällsynt. Ta inga smärtstillande medel eller läkemedel för att sänka febern.
- Svår **huvudvärk**, illamående, kräkningar, **feber**, stelhet i nacken eller medvetandesänkning (tecken på hjärnhinneinflammation). Detta är mycket sällsynt.
- **Minskad urinutsöndring**, ansamling av vätska i kroppen och allmän sjukdomskänsla (tecken på njursjukdom eller njursvikt). Detta är mycket sällsynt.

Om du upplever följande biverkningar, **kontakta läkare** så snart som möjligt:

- **Urtikaria** (nässelutslag, en typ av hudutslag med ljusröda, upphöjda, kliande knölar). Detta är sällsynt.

Övriga biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Dicломex Rapid:

Vanliga (kan förekomma hos högst 1 av 10 användare):

- huvudvärk, yrsel
- en snurrande eller svajande känsla (svindel)
- smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, gasbildning, aptitlöshet
- förhöjda leverenzymvärden i blodet
- hudutslag och -irritation.

Sällsynta (kan förekomma hos högst 1 av 1 000 användare):

- sömnighet, dåsighet
- väsande andningsljud och andnöd (astma)
- störningar i leverns funktion, inklusive inflammation i levern (hepatit) med eller utan gulsort
- inflammation i magsäckens slemhinna, sår i mage eller tolvfingertarm (eventuellt med blödning och perforation)
- vätskeansamling i kroppen, symtomen inkluderar svullna vrister (ödem).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos högst 1 av 10 000 användare):

- mentala/emotionella störningar, depression, ångest, mardrömmar
- störningar i uppfattningsförmågan samt minnesrubbningar, avvikelse i den normala uppfattningen om tid och rum, sömnlöshet, irritabilitet, kramper, darrningar
- störningar i smaksinnet
- stickningar och domningar i fingrar
- synstörningar (dimmigt synfält eller dubbelseende)
- öronsusningar och nedsatt hörsel
- snabba eller oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning), bröstmärter, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck
- inflammation i blodkärl (vaskulit)
- lunginflammation (pneumonit)
- symptom i nedre delen av buken och störningar i de nedre regionerna av tarmen, såsom blödningar i mag-tarmkanalen och inflammation, försämring av Crohns sjukdom/ulcerös kolit
- inflammation i mun eller tunga, skada på matstrupen, förstopning
- inflammation i bukspottkörteln
- mycket allvarligt fortskridande hepatitis B (inflammation i levern) och allvarliga leversjukdomar
- små fläckvisa blödningar under huden (purpura, orsakas också av allergier), hudutslag, eksem, ljustäckhet, hudrodnad och klåda
- hårvälfall
- akuta störningar i njurfunktionen, protein i urinen, blod i urinen, nefrotiskt syndrom (ansamling av vätska i kroppen och betydande utsöndring av protein i urinen), skador på njurvävnad
- svårighet att få erekton (impotens).

Biverkningar utan känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data)

- bröstmärter, vilka kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas akut koronart syndrom. Vänd dig omedelbart till läkare om du observerar bröstmärter.
- läkemedel av den typ Diclofenac Rapid tillhör kan vara förknippade med en lätt ökad risk för hjärtinfarkt eller hjärnslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

5. Hur Diclofenac Rapid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och blisterkorten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är diklofenakkalium. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg diklofenakkalium.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85 %, titandioxid (E171), talk, röd och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rödbrun, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en diameter på 11,1 mm.

Förpackningsstorlekar:

10, 20, 20x1, 30, 50, 50x1, 100 och 100x1 tablett i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Tyskland

Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Teva Finland Oy

PB 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 28.2.2023