

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Dacepton 10 mg/ml injektiioneste, liuos, sylinteriampulli

apomorfiinihydrokloridihemihydraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Dacepton on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Daceptonia
3. Miten Daceptonia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Daceptonin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dacepton on ja mihin sitä käytetään

Dacepton sisältää apomorfiini-injektioliuosta. Se pistetään ihon alle (subkutanisesti) vain tämän lääkkeen antoon tarkoitettuna D-mine-Pen-injektiokynällä. Daceptonin vaikuttava aine on apomorfiinihydrokloridihemihydraatti. Yksi millilitra liuosta sisältää 10 mg apomorfiinihydrokloridihemihydraattia.

Apomorfiinihydrokloridihemihydraatti kuuluu ns. dopamiiniagonistien lääkeaineryhmään. Daceptonia käytetään Parkinsonin taudin hoitoon. Apomorfiini auttaa vähentämään Parkinsonin tautipotilaan ”off”-vaiheessa eli liikuntakyvyttömyyden tilassa viettämää aikaa sellaisilla potilailla, joita on aiemmin hoidettu levodopalla (toinen Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke) ja/tai muilla dopamiiniagonisteilla.

Lääkäri tai sairaanhoitaja auttaa sinua tunnistamaan merkit, joiden ilmetessä lääkettä on otettava.

Nimestään huolimatta apomorfiini ei sisällä morfiinia.

Apomorfiinihydrokloridihemihydraattia, jota Dacepton sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Daceptonia

ÄLÄ käytä Daceptonia

- jos olet allerginen apomorfiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos olet alle 18-vuotias
- jos sinulla on hengitysvaikeuksia
- jos sinulla on demenia tai Alzheimerin tauti

- jos sinulla on jokin psyykkinen sairaus, jonka oireita ovat esimerkiksi aistiharhat, harhaluulot, ajatuksen hajanaisuus ja todellisuudentajun häviäminen
- jos sinulla on maksavaivoja
- jos sinulla on vaikea dyskinesia (pakkoliikkeitä) tai vaikea dystonia (liikuntakyvyttömyyttä) levodopahoidosta huolimatta
- jos sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi on todettu sydänsähkökäyrän (EKG) poikkeama, josta käytetään nimitystä ”pitkä QT-oireyhtymä”. Kerro siitä lääkärille.
- jos otat ondansetronia (lääke pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon).

Varoitukset ja varotoimet

Ennen kuin käytät Daceptionia, lääkäri ottaa sinulta EKG:n (sydänsähkökäyrän) ja pyytää luetteloon kaikista muista ottamistasi lääkkeistä. Tämä EKG otetaan uudelleen hoidon ensimmäisinä päivinä ja aina, kun se on lääkärin mielestä tarpeellista. Hän kysyy myös muista, erityisesti sydämeen liittyvistä sairauksista, joita sinulla saattaa olla. Jotkin kysymykset ja tutkimukset saatetaan toistaa jokaisella hoitokäynnillä. Jos sinulla esiintyy oireita, jotka voivat johtua sydähestä, esimerkiksi sydämentykyysiä, pyörtymistä tai pyörtymistä enteileviä oireita (presynkopeetä), ilmoita niistä heti lääkärille. Samoin jos sinulla on ripulia tai jos aloitat uuden lääkkeen käyttämisen, ilmoita siitä lääkärille.

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Daceptionia

- jos sinulla on munuaissairaus
- jos sinulla on keuhkosairaus
- jos sinulla on sydänsairaus
- jos sinulla on matala verenpaine tai sinua pyörryttää ja huimaa nostessasi seisomaan
- jos käytät kohonnutta verenpainetta alentavia lääkeitä
- jos voit pahoin tai oksennat
- jos Parkinsonin tauti aiheuttaa sinulle tiettyjä mielenterveysongelmia, kuten aistiharhoja ja sekavuutta
- jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen.

Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai muu sinua hoitava henkilö huomaatte, että sinulle on kehittymässä voimakas halu tai tarve käyttää sinulle epätavallisella tavalla tai jos et pysty vastustamaan mielihalua, pakonomaisista tarvetta tai houkutusta sellaiseen toimintaan, joka voi vahingoittaa sinua itseäsi tai muita. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena, ylensyömisenä tai tuhlaamisenä, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten ajatuksen tai tunteiden lisääntymisenä. **Lääkäri voi joutua muuttamaan annostasi tai lopettamaan lääkityksesi.**

Joillekin potilaille kehittyy addiktion kaltaisia oireita, jotka johtavat haluun käyttää suuria annoksia Dacepton -valmistetta tai muita Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkeitä.

Lapset ja nuoret

Dacepton-valmistetta ei pidä käyttää lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Dacepton

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä.

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä:

jos käytät sydänrytmisiin tunnetusti vaikuttavia lääkeitä. Näitä ovat rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini ja amiodaroni), masennuslääkkeet (esim. trisykliset masennuslääkkeet, kuten amitriptylini ja imipramiini) ja bakteeri-infektiolääkkeet (makrolidiantibiootit, kuten erytromysiini, atsitromysiini ja klaritromysiini) sekä domperidoni.

Jos otat ondansetronia (lääke pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon), koska tämä voi johtaa vakavaan laskuun verenpaineessa ja tajunnan menetykseen.

Jos käytät Daceptonia yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, näiden lääkkeiden vaikutus voi muuttua.

Tämä koskee erityisesti

- joitakin mielenterveyshäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkeitä, esimerkiksi klotsapiinia
- verenpainelääkeitä
- muita Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkeitä.

Lääkäri kertoo sinulle, jos apomorfiiniannostasi tai jonkin muun käyttämäsi lääkkeen annosta on muutettava.

Jos käytät sekä levodopaa (toinen Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettu lääke) että apomorfiinia, lääkärin on tutkittava veriarvosi säänöllisesti.

Dacepton ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ja juoma eivät vaikuta Daceptoniin tehoon.

Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Daceptonia ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Ei tiedetä, erityykö Dacepton rintamaitoon. Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää. Lääkäri antaa neuvoja joko imetyksen tai tämän lääkityksen jatkamisesta tai lopettamisesta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dacepton voi aiheuttaa uneliaisuutta ja voimakasta halua nukkua. Jos Dacepton vaikuttaa sinuun näin, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dacepton sisältää natriummetabisulfiitti

Natriummetabisulfiitti voi joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa vaikean allergisen reaktion, jonka oireita ovat esimerkiksi ihottuma tai ihon kutina; hengitysvaikeus; silmälouomien, kasvojen tai huulten turvotus tai kielen turvotus ja punoitus. Jos sinulla ilmenee tällaisia haittavaikutuksia, hakeudu heti lähimmän sairaalan ensiapuun.

Dacepton sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 10 ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”

3. Miten Daceptonia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen kuin käytät Daceptonia, lääkäri varmistaa, että siedät lääkettä ja pahoinvoinalääkettä, jota sinun täytyy käyttää samanaikaisesti.

Domperidonia on otettava vähintään 2 päivän ajan ennen Dacepton-hoidon aloittamista pahoinvoinnin tai oksentelun estämiseksi.

Älä käytä Daceptonia, jos

- liuos on muuttunut vihreäksi
- liuos on sameaa tai siinä näkyy hiukkasia.

Annostus

Dacepton-annoksesi ja pistosten päivittäinen lukumäärä määräytyvät tarpeidesi mukaan. Lääkäri keskustelee asiasta kanssasi ja kertoo, kuinka paljon ja kuinka usein sinun on lääkettä pistettävä. Sinulle sopivan annos määritetään erikoislääkärin vastaanotolla.

- Tavallinen vuorokausiannos on 3–30 mg.
- Tarvitsemasi annos voi olla jopa 100 mg vuorokaudessa.
- Tavallisesti lääkettä pistetään 1–10 kertaa vuorokaudessa.
- Yksi kertainjektilo saa olla enintään 10 mg.

D-mine-Pen-injektiokynä, jota tarvitaan sylinteriampullissa olevan Dacepton-injektioliuoksen antoon, ei sovi potilaille, jotka tarvitsevat yli 6 mg:n bolusannoksen. Näille potilaille on käytettävä jotain muuta valmistetta.

Daceptonia ei tarvitse laimentaa ennen käyttöä. Sitä ei saa myöskään sekoittaa muiden lääkkeiden kanssa.


- Lääkäri kertoo sinulle, kuinka suuri Dacepton-annoksesi on ja kuinka usein annos on pistettävä. Lääkäri kertoo tarvittaessa myös, miten Dacepton-annostasi on muutettava. Älä muuta Dacepton-annostasi äläkä tihennä Daceptonin käyttöä ilman lääkärin kehotusta.
- Lääkäri antaa sinulle ja sinua hoitaville henkilöille yksityiskohtaiset ohjeet annosten valmisteluun ja pistämiseen; erityistä huomiota kiinnitetään hoidossa tarvitsemasi injektiokynän oikeaan käyttöön.

Ennen Daceptonin käyttöä

Huomaa: Tämä pakaus EI sisällä injektiokynää eikä sen neuloja.

Dacepton-sylinteriampulleja voi käyttää vain D-mine-Pen-injektiokynän ja sen kertakäytöneulojen kanssa injektiokynän käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.

Injektiokynän kuvaus




- Pistä jokainen annos uudella injektioneulalla epäpuhtauksien välttämiseksi.
- Älä jaa neuloja ja injektiokynää kenenkään kanssa.
- Tutustu ennen Daceptonin käyttöä injektiokynään ja sen käyttöohjeisiin, jotta osaat käsitellä injektiokynää oikein.
- Jos injektiokynä on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla (mekaanisten vikojen vuoksi), katso lisätietoja injektiokynän käyttöohjeista.

Mihin ja miten Dacepton pistetään

- Pese ensin kädet.
- Ota ennen injektiokynän käytämistä esille muutama desinfointipyhy ja yksi suojuksessaan oleva injektioneula.
- Noudata injektiokynän käyttöohjeita.

Injektiokynän valmistelu / sylinteriampullin vaihto


Ota injektiokynä säilytyskotelostaan ja poista kynän suojuus.



Irrota sylinteriampullin holkki kääntämällä sitä myötäpäivään.



Vie holkkiin uusi sylinteriampulli.



Paina kierreversi kokonaan alas; parhaiten se käy sormenpäällä.




Työnnä sylinteriampullin holkki injektiokynän suojaureen ja lukitse paikoilleen kääntämällä holkkia vastapäivään.



Neulan kiinnittäminen injektiokynään


Noudata injektiokynän neulan käyttöohjeita. Poista foliosuojuks.



Napsauta / kierrä injektiokynän neula kiinni sylinteriampullin holkkiin.



Poista ulompi neulansuojuks. Säilytä se: tarvitset suojusta neulan turvalliseen poistamiseen ja hävittämiseen käytön jälkeen.



Poista ja hävitä sisempi neulansuojuks.



Injektiokynän ilmaaminen / toimivuuden tarkastaminen

Poista sylinteriampullissa mahdollisesti oleva ilma ennen ampullin käyttöä. Aseta testiannos käintämällä annossäädintä myötäpäivään. Tarkasta testiannos kynän annosnäytöstä katsomalla kynää suoraan ylhäältä alas, ei vinosti, niin että symboli ”♦” näkyy selvästi. Tämä ns. injektiokynän ilmaaminen on tärkeää, jotta saisit injektiokynästä täyden annoksen.



Tarkasta injektiokynän toimivuus pitämällä kynää pystyasennossa neula ylöspäin ja naputtamalla sylinteriampullin holkkia kevyesti, niin että ilma pääsee nousemaan ylös.



Paina painonappia.



Injektiokynän kärjestä pursuaa pari lääkepisaraa. Jos näin ei käy, paina painonappia uudestaan.



Annoksen asettaminen

Valitse tarvitsemasi annos käänämällä annossäädintä myötäpäivään. Voit korjata annosvalintaan käänämällä annossäädintä vastapäivään.



Pistäminen

- Valitse lääkkeen pistoskohta ja puhdista se ympäristöineen desinfiointipyöhkeellä.
- Pistä Dacepton vyötärön etupuolelle (vatsaan) tai reiden ulkosivulle ihon alle (subkutaanisesti) lääkärin tai sairaanhoitajan opastamalla tavalla.

Paina painonappi kokonaan sisään pistääessäsi. Pidä painonappi kokonaan alas painettuna lääkkeen purkautuessa sylinteriampullista. Kun ampulli on tyhjentynyt lääkkeestä kokonaan, odota 6 sekuntia ja vedä injektiokynän neula sitten hitaasti pois. Näiden 6 sekunnin aikana voit joko pitää painonapin alas painettuna tai vapauttaa sen. Tarkasta, että annosnäytössä on ”0,0” koko annoksen saamisen merkiksi.




- Pistä Dacepton joka kerta eri kohtaan. Tämä pienentää ihoreaktion riskiä Daceptonin pistoskohdassa. Älä pistä Daceptonia ihoalueelle, joka aristaa, punoitaa tai on tulehtunut tai vaurioitunut.
- Älä koskaan pistä annosta suoraan laskimoon (intravenöösistä) tai lihakseen (intramuskulaarisesti).

Daceptonin käytön jälkeen


Irrota neula ja hävitä se jokaisen pistoksen jälkeen (katso ohjeet neulan turvalliseen hävittämiseen kohdasta 5).

Neulan irrottaminen injektiokynästä jokaisen pistoksen jälkeen

Pane ulompi neulansuojuus varoen kynän neulan päälle.



Irrota kynän neula kiertämällä ulompaa suojusta myötäpäivään. Hävitä neula asianmukaisesti.



Vaihtoehto:

Aseta ulompi neulansuojuus avoin pää ylöspäin injektiokynän säilytyskotelon vasemmanpuoleisessa päässä olevaan koloon. Vie (kynässä kiinni oleva) neula varoen suojuksen avoimen pään sisään. Älä pidä kiinni neulansuojuksesta vaan paina neulaa voimakkaasti alas päin ja irrota neula kynästä käantämällä kynää vastapäivään.



Kiinnitä kynän suojuus tiiviisti paikoilleen aina käytön jälkeen.



- Jätä sylinteriampulli kynään.
- Yhtä sylinteriampullia voi käyttää enintään 15 vuorokautta (katso lisätietoa kohdasta 5 ”Daceptonin säilyttäminen”).
- Jos liuos ei riitä seuraavaan annokseen, poista ja hävitä sylinteriampulli.
- Hävitä neula turvallisesti injektiokynän käyttöohjeen mukaisesti.

Jos käytät enemmän Daceptonia kuin sinun pitäisi

- Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkyystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

- Sinulla voi ilmetä sydämen harvalyöntisyyttä, voimakasta oksentelua, voimakasta uneliaisuutta ja/tai hengitysvaikeuksia. Matalan verenpaineen vuoksi sinua saattaa myös pyörryttää tai huimata, erityisesti seisomaan nostessasi. Matalaan verenpaineeseen voi auttaa asettuminen makuulle ja jalkojen nostaminen ylös.

Jos unohtat käyttää Daceptonia

Ota lääkettä, kun tarvitset sitä seuraavan kerran. Älä otta kaksinkertaista annosta korvatakseen unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Daceptonin käytön

Älä lopeta Daceptonin käytöötä keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee allerginen reaktio, **lopeta** Dacepton 10 mg/ml injektionesteen käyttö ja ota **heti** yhteyttä lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapuun.

Allergisen reaktion merkkejä voivat olla

- ihottuma
- hengitysvaikeudet tai
- puristava tunne rinnassa
- silmälouomien, kasvojen tai hulullen turvotus
- nielun tai kielen turvotus tai punoitus.

Dacepton voi toisinaan aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä):

- pistoskohdassa ihon alla olevat kipeät ja aristavat kyhmyt, jotka saattavat myös punoittaa ja kutista. Tällaisten kyhmyjen muodostumisen välttämiseksi lääke kannattaa pistää joka kerta eri kohtaan.
- hallusinaatiot (sellaisen asioiden näkeminen, kuuleminen tai tunteminen, joita ei todellisuudessa ole).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

- pahoinvointi tai oksentelu, erityisesti Dacepton-hoidon alussa. Jos sinulla on pahoinvointia riippumatta siitä, käytätkö domperidonia vai et, ilmoita asiasta lääkärille tai sairaanhoitajalle mahdollisimman pian.
- väsymys tai voimakas uneliaisuus
- sekavuuus tai aistiharhat
- haukottelu
- huimaus tai pyörrytyksessä seisomaan nostessassa.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

- pakkoliikkeiden tai vapinan lisääntymisen "on"-vaiheissa
- hemolyttinen anemia (punasolujen epänormaali hajoaminen verisuonissa tai muualla elimistössä). Tämä on melko harvinainen haittavaikutus, jota voi ilmetä myös levodopaa käytävillä potilailla.
- äkillinen nukahtelu
- ihottumat
- hengitysvaikeudet
- pistoskohdan haavautuminen

- punasolumääärän väheneminen, mikä voi ilmetä ihmisen kellertymisenä ja aiheuttaa heikkoutta tai hengenahdistusta
- verihiuutalemääärän väheneminen, mikä lisää verenvuodon ja mustelmien riskiä.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

- allerginen reaktio
- eosinofilia eli valkosolujen poikkeuksellisen suuri määrä veressä tai kudoksissa.

Haiittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin):

- jalkojen, jalkaterien tai sormien turvotus
- pyörtyminen
- aggressio (vihamielisyys), agitaatio (kiihyneisyys)
- päänsärky
- kyvyttömyys vastustaa mielihalua, pakonomaista tarvetta tai houkutusta sellaiseen toimintaan, joka voisi vahingoittaa sinua itseäsi tai muita. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta:
 - o voimakas pelihimo huolimatta vakavista seurauksista sinulle itsellesi tai perheellesi
 - o seksuaalisen kiinnostuksen ja käyttäytymisen muuttuminen tai lisääntyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu, joka aiheuttaa sinulle tai muille merkittävää huolta
 - o hallitsematon liiallinen ostelu tai tuhlailu
 - o ruoan ahmiminen (suurien ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakonomainen syöminen (enemmän kuin normaalista ja enemmän kuin on tarpeen).

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, miten oireita voidaan hallita tai vähentää.

Haiittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haiittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haiittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haiittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haiittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 Lääkkeiden haiittavaikutusrekisteri
 PL 55
 00034 FIMEA

5. Daceptonin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärä (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätä.

Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytä avattu valmiste käyttökertojen välissä samoissa olosuhteissa.

Sylinteriampullia voi käyttää käyttöönnoton jälkeen enintään 15 vuorokautta. Älä käytä sylinteriampullia enää uudelleen tämän jälkeen. Käytä uutta sylinteriampullia.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat liuoksen muuttuneen vihreäksi. Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkasta ja väritöntä tai kellertävää eikä siinä ole näkyviä hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellään suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dacepton sisältää

- Vaikuttava aine on apomorfiinihydrokloridihemihydraatti. Yksi millilitra Dacepton-injektioliuosta sisältää 10 mg apomorfiinihydrokloridihemihydraattia.
Dacepton-injektioliuos on saatavana 3 ml:n sylinteriampullissa, jossa on 30 mg apomorfiinihydrokloridihemihydraattia.
- Muut aineet ovat natriummetabisulfiitti (E223), kloorivetyhappo (pH:n säätöön), natriumhydroksidi (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Katso natriummetabisulfiittia koskevat tiedot kohdasta 2 ”Dacepton sisältää natriummetabisulfiittia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dacepton-injektioliuos on kirkasta ja väritöntä tai kellertävää, eikä siinä ole hiukkasia. Se on pakattu kirkkaasta lasista tehtyyn sylinteriampulliin, jossa on bromobutylylikumitulppa ja alumiininen korkki, jossa on bromobutyly-/synteettinen polyisopreenikumitiiviste.

Yksi sylinteriampuli sisältää 3 ml injektioliusta. Pakkaukset sisältävät joko 5, 10 tai 30 sylinteriampulia muovialustassa, joka on pahvikotelossa.

Muut pakkaukset: 2 x 5 x 3 ml, 6 x 5 x 3 ml ja 3 x 10 x 3 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach
Itävalta

Valmistaja:

EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach
Itävalta

EVER Pharma Jena GmbH
Otto-Schott-Str. 15
07745 Jena
Saksa

EVER Pharma Jena GmbH
Brüsseler Str. 18
07747 Jena
Saksa

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

AT	Dacepton® 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone
----	--

BE	Dacepton® 10 mg /ml oplossing voor injectie in een patroon
BG	Дацептон® 10 mg/ml инжекционен разтвор в патрон
CZ	Dacepton®
DE	Dacepton® 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone
DK	Dacepton®
ES	Dacepton® 10 mg/ml solución inyectable en cartucho EFG
FI	Dacepton® 10 mg/ml injektioneste, liuos, sylinderampulli
FR	Dopaceptin® 10 mg /ml Solution injectable en cartouche
GR	Dopaceptin® 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο
HR	Dacepton® 10 mg/ml otopina za injekciju u ulošku
HU	Dacepton® 10 mg/ml oldatos injekció patronban
IE	Dacepton® 10 mg/ml solution for injection in cartridge
IT	Dopaceptin® 10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia
LU	Dacepton® 10 mg/ml Solution injectable en cartouche
NL	Dacepton® 10 mg /ml oplossing voor injectie in een patroon
NO	Dacepton®
PL	Dacepton® 10 mg /ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
PT	Dacepton® 10mg/ml solução injetável em cartucho
SE	Dacepton® 10 mg/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull
SI	Dacepton® 10 mg/ml raztopina za injiciranje v vložku
SK	Dacepton® 10mg/ml Injekčný roztok v náplni
UK (NI)	Dacepton® 10 mg /ml solution for injection in cartridge

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.09.2023

Bipacksedel: Information till användaren

Dacepton 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, i cylinderampull

apomorfinhydrokloridhemihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Dacepton är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dacepton
3. Hur du använder Dacepton
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dacepton ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dacepton är och vad det används för

Dacepton innehåller apomorfin. Läkemedlet injiceras under huden (subkutant) med injektionspennan D-mine-Pen, som är avsedd för detta läkemedel. Den aktiva substansen i Dacepton är apomorfinhydrokloridhemihydrat. En milliliter avlösningen innehåller 10 mg apomorfinhydrokloridhemihydrat.

Apomorfinhydrokloridhemihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister. Dacepton används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin hjälper att förkorta längden på ”off”- tillstånden d.v.s. orörlighetstillstånden, hos patienter som tidigare behandlats med levodopa (en annan behandling för Parkinsons sjukdom) och/eller andra dopaminagonister.

Läkaren eller sjuksköterskan hjälper dig att känna igen tecknen för när du behöver ta läkemedlet.

Trots namnet innehåller apomorfin inte morfin.

Apomorfinhydrokloridhemihydrat, som finns i Dacepton, kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras anvisningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dacepton

Använd INTE Dacepton

- om du är allergisk mot apomorfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du är under 18 års ålder
- om du har andningssvårigheter
- om du har demens eller Alzheimers sjukdom
- om du har en psykisk sjukdom med symtom som hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, förlust av kontakt med verkligheten
- om du har en leversjukdom

- om du har svår dyskinesi (tvångsrörelser), eller svår dystoni (oförmåga att röra sig) trots att du använder levodopa
- om du eller någon i din familj har avvikeler på sitt elektrokardiogram (EKG) som kallas ”långt QT-syndrom”. Tala om det för läkaren.
- om du tar ondansetron (läkemedel för behandling av illamående och kräkningar).

Varningar och försiktighet

Innan du använder Dacepton, kommer läkaren att göra ett EKG (elektrokardiogram) och fråga dig vilka mediciner du använder. EKG-undersökningen kommer att upprepas under de första dagarna av din behandling och även vid tillfället då läkaren anser det vara nödvändigt. Läkaren kommer också att fråga dig om andra sjukdomar du kanske har, särskilt sjukdomar som är förknippade med hjärtat. Några av frågorna och undersökningarna kan upprepas under varje läkarbesök. Om du får symptom som kan komma från hjärtat t.ex. hjärtklappning, svimning eller känsla av svimning, ska du tala om det för din läkare omedelbart. Likväl om du får diarré eller börjar använda ett nytt läkemedel, bör du tala om det för din läkare.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dacepton

- om du har en njursjukdom
- om du har en lungsjukdom
- om du har en hjärtsjukdom
- om du har lågt blodtryck, eller känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp
- om du tar något läkemedel mot högt blodtryck
- om du mår illa eller kräks
- om Parkinsons sjukdom orsakar dig psykiska problem, såsom hallucinationer och förvirring
- om du är äldre eller svag.

Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanligt för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt åtande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. **Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.**

Vissa patienter får beroendeliknande symptom som leder till begär efter stora doser Dacepton och andra läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Barn och ungdomar

Dacepton ska inte användas för barn och ungdomar under 18år.

Andra läkemedel och Dacepton

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

Om du använder läkemedel som kan påverka hjärtrytmen. Dessa läkemedel omfattar läkemedel mot hjärtarytmia (såsom kinidin och amiodaron), depression (däribland tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin och imipramin) och bakterieinfektioner (makrolidantibiotika såsom erytromycin, azitromycin och klaritromycin) samt domperidon.

Om du tar ondansetron (läkemedel mot illamående och kräkningar) eftersom detta kan leda till kraftigt blodtrycksfall och medvetslöshet.

Om du använder Dacepton tillsammans med andra läkemedel kan effekten av dessa läkemedel påverkas.

Detta gäller särskilt:

- läkemedel, såsom klozapin, som används vid behandling av vissa psykiska störningar

- blodtryckssänkande läkemedel
- andra läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom.

Läkaren talar om för dig om du behöver ändra din apomorfindos eller dosen av något av dina andra läkemedel.

Om du använder både levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom) och apomorfin ska du gå på blodprovskontroller regelbundet.

Dacepton med mat och dryck

Mat och dryck har ingen påverkan på Daceptons effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dacepton ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om Dacepton utsöndras i bröstmjölk. Tala med läkaren om du ammar eller avser att amma. Läkaren förklrar för dig, om du ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta att ta detta läkemedel.

Körförstående och användning av maskiner

Dacepton kan orsaka dåsighet och kraftigt sömnbehov. Om Dacepton har sådan verkan på dig, ska du inte köra och använda några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dacepton innehåller natriummetabisulfit

Dacepton innehåller natriummetabisulfit, som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner med symtom såsom utslag eller klåda på huden, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, svullen eller röd tunga. Om du får någon av dessa biverkningar uppsök läkare omedelbart.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Dacepton

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du använder apomorfin, kommer läkaren att kontrollera att du tål läkemedlet och ett läkemedel mot illamående och kräkningar som du behöver ta samtidigt.

Domperidon ska tas under minst två dagar före Daceptonbehandlingen påbörjas för att hindra dig från att må illa eller kräkas.

Använd inte Dacepton om

- lösningen har blivit grönfärgad
- lösningen är grumlig eller du ser partiklar i den.

Dosering

Mängden och hur ofta du behöver injicera Dacepton per dag beror på dina individuella behov. Läkaren kommer att diskutera detta med dig och berättar hur mycket läkemedel du ska använda och hur ofta. Dosen som är lämplig för dig har bestämts under ditt besök hos specialläkaren.

- Vanlig daglig dos är 3-30 mg.
- Du kan behöva upp till 100 mg per dag.
- Normalt behöver du 1-10 injektioner dagligen.
- En enskild injektion ska inte överskrida 6 mg.

Injektionspennan D-mine-Pen, som du behöver för att ge Dacepton injektionslösning i cylinderampull är inte lämplig för patienter som behöver doser som överstiger 6 mg per injektion. Dessa patienter bör använda andra läkemedel.

Dacepton behöver inte spädas före användning. Det ska inte heller blandas med andra läkemedel.


- Läkaren berättar för dig hur stor dos, och hur ofta, du ska injicera Dacepton. Läkaren berättar också för dig hur du ändrar din Daceptondos om det behövs. Ändra inte din Daceptondos eller ta inte läkemedlet oftare än normalt om inte läkaren har sagt så.
- Du och din vårdare får detaljerade anvisningar för beredning och injicering av doserna och särskild betoning fästs på korrekt användning av injektionspennan som behövs för behandlingen.

Innan du använder Dacepton

Observera: Förpackningen innehåller INTE injektionspenna eller nålar till injektionspennan.

Dacepton cylinderampullerna kan endast användas i en D-mine-Penna och med engångsnålar avsedda för den, såsom det anges i injektionspennans bruksanvisning.

Beskrivning av injektionspennan




- Använd alltid en ny engångsnål till varje injektion för att undvika kontaminering
- Nålarna och injektionspennan ska inte delas med någon annan person.
- Innan du använder Dacepton, ska du bekanta dig med injektionspennan och bruksanvisningen, så att du kan använda den på rätt sätt
- om din injektionspenna är skadad eller inte fungerar som den ska, (p.g.a. ett mekaniskt fel) se injektionspennans bruksanvisning för att få råd.

Var och hur du injicerar Dacepton

- Börja med att tvätta dina händer.
- Innan du använder injektionspennan behöver du några antiseptiska rengöringsdukar och en nål med skyddshatten på.
- Följ injektionspennans bruksanvisning.

Beredning av injektionspennan / byte av cylinderampull


Ta ut injektionspennan ur förvaringsfodralet och avlägsna injektionspennans skyddslock.



Avlägsna cylinderampullens hölje genom att vrida det medsols.



Placera en ny cylinderampull i höljet.



Tryck in det gängade skaftet helt och hållt, bäst går det med fingerspetsen.



Tryck in cylinderampullens hölje i injektionspennans skyddsfodral och lås genom att vrida höljet motsols.




Hur du fäster nålen


Följ anvisningarna för användning av injektionspennans nål. Avlägsna skyddsfolien.



Knäpp fast / vrid på injektionspennans nål på cylinderampullens hölje.



Avlägsna nålens yttre skyddshatt. Spara skyddet: du behöver skyddshatten för att tryggt kunna avlägsna och kassera nålen efter användning.



Avlägsna och kassera det inre nålskyddet.



Förberedning av injektionspennan / kontroll av pennans funktion

Avlägsna all luft från cylinderampullen före användning. Ställ in testdosen genom att skruva doseringsratten med sols. Kontrollera den inställda testdosen genom att titta på inspekionsfönstret vertikalt uppifrån, inte snett, så att symbolen ”♦” tydligt syns. Detta kallas ”förberedning” och är viktigt för att vara säker på att du får hela din dos när du använder pennan.



Kontrollera att injektionspennan fungerar genom att hålla pennan vertikalt med nålen uppåt och knacka lätt på cylinderampullens hölje så att luftbubblorna kan stiga uppåt.



Tryck in knappen.



Några droppar läkemedel pressas ut från injektionspennans spets. Om detta inte sker, tryck på knappen en gång till.



Inställning av dosen


Välj den dos du behöver genom att skruva doseringsratten medsols. Du kan korrigera dosen genom att skruva doseringsratten motsols.



Injektion

- Välj ut ett injektionsställe och rengör stället med omgivning, med en antiseptisk duk.
- Injicera Dacepton under huden (subkutant) på framsidan av midjan (magen) eller på utsidan av låren enligt din läkares eller sjuksköterskas anvisningar.

Tryck in knappen helt och hållit när du injicerar. Håll knappen intryckt medan läkemedlet trycks ut ur cylinderampullen. När läkemedelsdosen har tryckts ut fullständigt, vänta 6 sekunder och dra sedan långsamt ut injektionspennans nål. Under dessa 6 sekunder kan du antingen hålla knappen intryckt eller släppa upp den. Kontrollera att det står ”0,0” i inspektionsfönstret som är tecknet på att du fått hela dosen.




- Injicera Dacepton på olika ställen varje gång. Detta minskar risken för hudreaktioner vid injektionsstället. Injicera inte Dacepton på ett hudområde som är ömt, rodnande eller infekterat eller skadat.
- Injicera aldrig i en ven (intravenöst) eller i en muskel (intramuskulärt).

Efter att du använt Dacepton

Avlägsna och kassera nålen efter varje injektion (se anvisningar för trygg kassering av nålar i avsnitt 5)

Avlägsnandet av nälen efter varje injektion

Placera den yttre skyddshatten försiktigt på nälen.



Vrid loss nälen från pennan genom att vrinda det yttre nälskyddet medsols. Kassera nälen på korrekt sätt.



Alternativ:

Placera det yttre nälskyddet med öppningen uppåt, i hålet som finns på den vänstra sidans kortända i injektionspennans förvaringsfodral. Stick försiktigt in nälen (som är fast i pennan) i skyddshatten. Håll inte i nälskyddet utan tryck kraftigt neråt och lösgör nälen genom att vrinda pennan motsols.



Placera injektionspennans skyddslock tätt på plats efter varje användningsgång.



- Lämna cylinderampullen i pennan.
- En cylinderampull kan användas i högst 15 dagar (se tilläggsinformation i avsnitt ”Hur Dacepton ska förvaras”).
- Om lösningen inte räcker till nästa dos, avlägsna och kassera cylinderampullen.
- Kassera nälen tryggt enligt instruktionerna i injektionspennans bruksanvisning.

Om du har tagit för stor mängd av Dacepton

- Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.
- Du kan få symptom, såsom långsam hjärtrytm, kraftiga kräkningar, kraftig sömnighet och/eller svårighet att andas. Du kan också känna dig svimfördig eller yr, särskilt när du reser dig upp p.g.a. lågt blodtryck. Vid lågt blodtryck kan det hjälpa att lägga sig ner och lyfta upp fötterna i upphöjt läge.

Om du har glömt att ta använda Dacepton

Använd Dacepton när du behöver det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Dacepton

Sluta inte använda Dacepton utan att först rådfråga läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får en allergisk reaktion, **sluta** ta Dacepton 10 mg/ml och kontakta läkare eller sjukhus **omedelbart**.

Tecken på en allergisk reaktion kan vara:

- hudutslag
- andningssvårigheter eller
- pressande känsla i bröstet
- svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar
- svullnad eller rodnad av svalget eller tungan

Dacepton kan orsaka följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- ömma knutor under huden vid injektionsstället, som kan vara röda och kliande. För att undvika att få dessa knutor rekommenderas att du varje gång injiceras på ett nytt ställe.
- hallucinationer (ser, hör eller känner sådant som inte är verkligt)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- illamående eller kräkningar, särskilt i början av behandlingen med Dacepton. Om du mår illa oberoende av om du använder domperidon eller inte, kontakta läkare eller sjuksköterska så fort som möjligt.
- trötthet eller kraftig sömnighet
- förvirring eller hallucinationer
- gäspningar
- yrsel eller svindel när du reser dig upp.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- ökade ofrivilliga rörelser eller förvärrade skakningar under s.k. "on"-perioder
- hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar i blodkärl eller andra delar av kroppen). Detta är en mindre vanlig biverkning som även kan förekomma hos patienter som tar levodopa
- somnar plötsligt
- hudutslag
- andningssvårigheter
- sårbildning vid injektionsstället

- minskning i antalet röda blodkroppar, vilket kan göra att huden blir blekt gulfärgad och kan orsaka svaghet eller andfåddhet
- minskning i antalet blodplättar, vilket kan öka risken för blödningar eller blåmärken.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- en allergisk reaktion
- eosinofili, ett onormalt högt antal vita blodkroppar i blodet eller i vävnaderna.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- svullnad av ben, fötter eller fingrar
- svimning
- aggression, oro, rastlöshet
- huvudvärk
- oförmåga att motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra en handling som kan vara skadlig för dig eller någon annan, vilket kan inkludera:
 - Stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj.
 - Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.
 - Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar.
 - Hetsätande (intag av stora mängder mat under kort tid), eller tvångsätande (intag av mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa hungern).

Tala om för läkaren om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller lindra symptomen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 FIMEA

5. Hur Dacepton ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara cylinderampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningarna är de samma för läkemedlet efter öppnandet och mellan användningstillfällena.

När du öppnat en cylinderampull ska den användas i högst 15 dagar. Använd inte cylinderampullen efter att tiden förlöpt. Ta i bruk en ny cylinderampull.

Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen blivit grön. Läkemedlet får endast användas om lösningen är klar och färglös till svagt gulaktig och fri från partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är apomorfinhydrokloridhemihydrat. En milliliter Dacepton innehåller 10 mg apomorfinhydrokloridhemihydrat.
Dacepton finns i cylinderampuller om 3 ml som innehåller 30 mg apomorfinhydrokloridhemihydrat.
- Övriga innehållsämnen är: Natriummetabisulfit (E223), saltsyra (för justering av pH), natriumhydroxid (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

För information om natriummetabisulfit se avsnitt 2 ”Dacepton innehåller natriummetabisulfit”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dacepton är en klar och färglös till gulaktig injektionsvätska, lösning fri från partiklar i klara, cylinderampuller av glas med gummipropp av bromobutyl och ett lock av aluminium med gummiförslutning av bromobutyl/syntetisk polyisopren.

En cylinderampull innehåller 3 ml injektionsvätska, lösning. Förpackningarna innehåller: 5, 10 eller 30 cylinderampuller på en plastbricka i pappkartong.

Övriga förpackningar: 2 x 5 x 3 ml, 6 x 5 x 3 ml och 3 x 10 x 3 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach

Österrike

Tillverkare:

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach

Österrike

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Str. 15

07745 Jena

Tyskland

EVER Pharma Jena GmbH

Brüsseler Str. 18

07747 Jena

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

AT	Dacepton® 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone
----	--

BE	Dacepton® 10 mg /ml oplossing voor injectie in een patroon
BG	Дацептон® 10 mg/ml инжекционен разтвор в патрон
CZ	Dacepton®
DE	Dacepton® 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patronen
DK	Dacepton®
ES	Dacepton® 10 mg/ml solución inyectable en cartucho EFG
FI	Dacepton® 10 mg/ml injektioneste, liuos, sylinderampulli
FR	Dopaceptin® 10 mg /ml Solution injectable en cartouche
GR	Dopaceptin® 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο
HR	Dacepton® 10 mg/ml otopina za injekciju u ulošku
HU	Dacepton® 10 mg/ml oldatos injekció patronban
IE	Dacepton® 10 mg/ml solution for injection in cartridge
IT	Dopaceptin® 10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia
LU	Dacepton® 10 mg/ml Solution injectable en cartouche
NL	Dacepton® 10 mg /ml oplossing voor injectie in een patroon
NO	Dacepton®
PL	Dacepton® 10 mg /ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
PT	Dacepton® 10mg/ml solução injetável em cartucho
SE	Dacepton® 10 mg/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull
SI	Dacepton® 10 mg/ml raztopina za injiciranje v vložku
SK	Dacepton® 10mg/ml Injekčný roztok v náplni
UK (NI)	Dacepton® 10 mg /ml solution for injection in cartridge

Denna bipacksedel ändrades senast 29.09.2023