Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Scaderm 250 mg/g emulsio iholle
bentsyylibentsoaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Scaderm 250 mg/g on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Scaderm 250 mg/g -valmistetta
3. Miten Scaderm 250 mg/g -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Scaderm 250 mg/g -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Scaderm 250 mg/g on ja mihin sitä käytetään

Scaderm 250 mg/g on iholle levitettävä loislääke.

Scaderm 250 mg/g on tarkoitettu syyhyn hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Scaderm 250 mg/g -valmistetta

Älä käytä Scaderm 250 mg/g -valmistetta
- jos olet allerginen bentsyylibentsoaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- imetyksen aikana
- alle 12-vuotiaille lapsille.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Scaderm 250 mg/g -valmistetta.

- Huomioi, että Scaderm 250 mg/g -valmistetta ei saa joutua silmiin, limakalvoille tai voimakkaasti ärtyneelle iholle.
- Jos sinulla esiintyy tai on aiemmin esiintynyt epileptisiä kohtauksia, keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää Scaderm 250 mg/g -valmistetta.
- Vältä runsasta altistumista auringolle (myös solariumia) käytön aikana.
- Jos oireet jatkuvat hoidon jälkeen, keskustele lääkärin kanssa. Hoitoa saa jatkaa vain lääkärin luvalla.

- Scaderm 250 mg/g voi vahingoittaa herkkiä pintoja. Seurauksena saattaa olla esimerkiksi värimuutoksia. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää puuvillakäsineitä koskettaessa mahdollisesti herkkiä pintoja.

Levittäminen päähän
Poikkeustapauksissa syyhypunkkeja voi esiintyä myös pään tai kasvojen alueella (kuten päänahassa/hiuksissa). Lääkäri voi tällöin määrätä Scaderm 250 mg/g -hoitoa pään alueelle. Valmiste levitetään tällöin terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa. Lue kohdasta 3 lisätietoja valmisteen levittämisestä.

Käyttö lapsille
Tämän lääkevalmisteen käyttöä lapsille ei ole tutkittu riittävästi. Näin ollen sitä ei saa käyttää alle 12-vuotiaille lapsille. Lapsille on saatavana Scaderm 100 mg/g -valmiste, joka sisältää vähemmän vaikuttavaa ainetta.

Muut lääkevalmisteet ja Scaderm 250 mg/g
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.
Scaderm 250 mg/g -valmisteella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa. Mahdollisten yhteisvaikutusten estämiseksi samanaikaista käyttöä muiden kutinaa lievittävien paikallishoitovalmisteiden kanssa pitää välttää.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käyttö raskauden aikana
Vaikuttavan aineen käytöstä raskaana oleville naisille ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja. Eläimillä tehdyistä tutkimusta saadut tiedot eivät riitä lisääntymistoksisuuden selvittämiseen. Scaderm 250 mg/g -valmistetta saa käyttää raskauden aikana vain, jos lääkäri riskejä punnittuaan pitää sitä ehdottoman välttämättömänä.

Käyttö imetyksen aikana
Ei tiedetä, erittyykö vaikuttava aine, bentsyylibentsoaatti, ihmisellä äidinmaitoon. Scaderm 250 mg/g -valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Bentsyylibentsoaatin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Erityisiä varotoimia ei tarvita.

Scaderm 250 mg/g sisältää setostearyylialkoholia ja propyleeniglykolia
Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. allergista kosketusihottumaa). Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg propyleeniglykolia (E 1520) per gramma. Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Potilaan kanssa kontaktissa olleet henkilöt
Syyhypotilaiden kanssa kontaktissa olleet henkilöt on tutkittava. Kutina ilmaantuu vasta noin 3–5 viikon kuluttua tartunnasta, joten tartunnat saattavat levitä aluksi huomaamattomasti perheissä, koululuokissa, päiväkotiryhmissä, asuntoloissa ja hoitolaitoksissa. Tartunnan saaneen välitön lähipiiri on tärkeää hoitaa riippumatta siitä, onko heillä iho-oireita. Näin voidaan hoitaa mahdolliset tartunnat, joita ei ole vielä havaittu, ja estää syyhypunkin leviäminen sekä uusintatartunnat.

3. Miten Scaderm 250 mg/g -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Scaderm 250 mg/g on tarkoitettu käytettäväksi aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille.

Suositeltu annos on:
Levitä emulsiota iholle kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä.
Lopeta hoito sen jälkeen, vaikka kutina jatkuisi.

- Puhdista iho huolellisesti (kylvyssä tai suihkussa) ennen hoidon aloittamista, ja tarvittaessa leikkaa kynnet. Voit peseytyä myös seuraavana kahtena hoitopäivänä ennen valmisteen levittämistä. Levitä Scaderm 250 mg/g -valmistetta vasta kun iho on täysin kuivunut ja lämpötila on normalisoitunut, noin 60 minuutin kuluttua suihkussa käynnin jälkeen.
- Levitä Scaderm 250 mg/g -valmistetta huolellisesti koko keholle, niskasta varpaisiin kolmena peräkkäisenä päivänä. Levitä emulsio ohueksi ja tasaiseksi kerrokseksi, kuten aurinkovoide. Levityskertojen välisen ajan tulee olla noin 24 tuntia.
- Hoida erityisen huolellisesti alueet, joilla on näkyviä oireita. Levitä emulsiota huolellisesti jokaiseen sormeen ja varpaaseen, sormi- ja varvasväleihin, ihopoimuihin, rintakehään, ulkoisiin sukupuolielimiin (ei limakalvoille), keskivartaloon ja pakaroiden alueelle. Syyhypunkit viihtyvät erityisesti näillä alueilla.
- Jos lääkäri on neuvonut levittämään Scaderm 250 mg/g -valmistetta myös päähän, on tärkeää varmistaa huolellisesti, ettei valmistetta joudu silmien, suun eikä nenän alueelle.
- Jos peset käsiäsi päivän aikana, emulsiota on lisättävä niihin on välittömästi pesun jälkeen.
- Käy neljäntenä päivänä suihkussa tai kylvyssä ja pese kaikki lääke pois iholta.
- Vaihda kaikki vaatteesi (alus- ja päällysvaatteet) sekä vuodevaatteet päivittäin hoidon aikana. Vaihda lisäksi kaikki neljäntenä päivänä .

Miten pitkään Scaderm 250 mg/g -valmistetta voi käyttää
Valmistetta käytetään kolmena peräkkäisenä päivänä.
Älä käytä Scaderm 250 mg/g -valmistetta useampana kuin kolmena päivänä, ellei lääkäri ole neuvonut tekemään niin. Jos kutina jatkuu hoidon jälkeenkin, on hyvin tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin. Jatkohoito saattaa olla tarpeen.

Jos Scaderm 250 mg/g -valmisteen vaikutus on mielestäsi liian heikko tai liian voimakas, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos käytät enemmän Scaderm 250 mg/g -valmistetta kuin sinun pitäisi
Poista ylimääräinen valmiste iholta liinalla. Yliannostustapauksia ei ole tiedossa.
Jos vaikkapa lapsi on niellyt lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Scaderm 250 mg/g -valmistetta
Älä käytä sitä kahdesti seuraavana päivänä äläkä ota kaksinkertaista annosta, vaan jatka käyttöä ohjeiden mukaisesti yhteensä kolmen päivän ajan.

Jos lopetat Scaderm 250 mg/g -valmisteen käytön
Syyhypunkit säilyvät elinkykyisinä ja alkuperäiset oireet palaavat.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tekstiilien ja esineiden käsittely
On tärkeää siivota ympäristö, jotta uusia tartuntoja voidaan ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. Syyhypunkit kuolevat luotettavasti yli 50 °C:n lämpötiloissa ja tukahduttamalla.

Siksi käytetyt lakanat, alusvaatteet, pyyhkeet ja päällysvaatteet on pestävä vähintään 60 °C:ssa. Tämä koskee myös muita esineitä, joiden kanssa tartunnan saanut on ollut kosketuksissa, esimerkiksi pehmoleluja, verenpainemittareiden mansetteja ja kenkiä. Esineitä ja vaatteita, joita voidaan pestä vain matalammissa lämpötiloissa tai ei lainkaan, on säilytettävä suljetuissa muovipusseissa seitsemän vuorokauden ajan.
Matot, patjat ja verhoillut huonekalut on imuroitava huolellisesti.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä): iho- ja limakalvoärsytys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta): sitkeä kutina.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):
- yliherkkyysreaktiot, jotka ilmenevät pahoinvointina, nokkosihottumana ja allergisena turvotuksena (angioedeema) sekä tulehduksellisena ihoreaktiona (kosketusihottumana)
- epileptiset kohtaukset lapsilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Scaderm 250 mg/g -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Käytä emulsio 3 viikon kuluessa pullon avaamisesta, mutta älä enää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Scaderm 250 mg/g sisältää
- Vaikuttava aine on bentsyylibentsoaatti. 1 g emulsiota sisältää 250 mg bentsyylibentsoaattia.Muut ainesosat ovat emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), propyleeniglykoli (E 1520), puhdistettu vesi, nestemäinen (kiteytymätön) sorbitoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen emulsio iholle ruskeassa lasipullossa, joka on pakattu pahvikoteloon. Saatavana on yksi pakkauskoko, joka sisältää 200 g emulsiota.

Myyntiluvan haltija
Strathmann GmbH & Co. KG
Langenhorner Chaussee 602
22419 Hampuri
Saksa

Valmistaja
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 21.05.2026

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Scaderm 250 mg/g kutan emulsion
bensylbensoat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Scaderm 250 mg/g är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Scaderm 250 mg/g
3. Hur du använder Scaderm 250 mg/g
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Scaderm 250 mg/g ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Scaderm 250 mg/g är och vad det används för

Scaderm 250 mg/g är ett medel mot parasiter som appliceras på huden.

Scaderm 250 mg/g används för att behandla skabb hos vuxna och ungdomar från 12 år.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Scaderm 250 mg/g

Använd inte Scaderm 250 mg/g
- om du är allergisk mot bensylbensoat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- under amning
- till barn under 12 års ålder.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Scaderm 250 mg/g.

- Observera att Scaderm 250 mg/g inte får komma i kontakt med ögon, slemhinnor eller mycket irriterad hud.
- Om du lider av epileptiska anfall och/eller om du har haft sådana tidigare, måste du alltid konsultera läkare innan du använder Scaderm 250 mg/g.
- Undvik intensiv solexponering (t.ex. även solarium) under användning.
- Om symtomen kvarstår efter behandlingen, kontakta läkare. Ytterligare behandling får bara ges efter samtycke från en läkare.
- Känsliga ytor kan påverkas av Scaderm 250 mg/g. Detta kan leda till exempelvis färgförändringar. Således bör bomullshandskar användas vid beröring av eventuellt känsliga ytor.

Applicering på huvudet

I undantagsfall, om håret på huvudet och/eller ansiktet (inklusive skalpen/håret) också är drabbade av skabbkvalster, kan läkaren ordinera användning av Scaderm 250 mg/g på huvudet.
En sådan applicering ska dock endast utföras under medicinsk övervakning. Se avsnitt 3 för appliceringssätt.

Användning för barn
Användningen av detta läkemedel hos barn har inte undersökts tillräckligt. Det får därför inte användas till barn under 12 års ålder. För barn i åldern 1 till 11 år finns det en produkt med en lägre styrka: Scaderm 100mg/g.

Andra läkemedel och Scaderm 250 mg/g
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Det finns inga kända interaktioner mellan Scaderm 250 mg/g och andra läkemedel. Det ska dock inte användas samtidigt som andra topikala läkemedel mot klåda för utesluta eventuella interaktioner.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Användning under graviditet
Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av bensylbensoat hos gravida kvinnor. Data från djurstudier är otillräckliga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter. Du ska därför endast använda Scaderm 250 mg/g under graviditet om läkaren anser att detta är absolut nödvändigt efter att ha övervägt alla potentiella risker.

Användning under amning
Det är okänt om bensylbensoat från bensylbensoat utsöndras i bröstmjölk. Scaderm 250 mg/g får således inte användas under amning.

Fertilitet
Det finns inga data om effekten av bensylbensoat på fertiliteten hos människor.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.

Scaderm 250 mg/g innehåller cetostearylalkohol och propylenglykol
Cetostearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).
Detta läkemedel innehåller 100 mg propylenglykol (E 1520) per gram emulsion, vilket kan orsaka hudirritation.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner till patienter med skabb måste undersökas. Eftersom klådan uppkommer först 3 till 5 veckor efter infektionen kan infektion spridas, till en början obemärkt, till familjen, skolklasser och förskolor, vid delat boende och på vårdinrättningar. Oavsett om det finns hudskador eller inte, är det viktigt att behandla personer i den omedelbara närheten. Detta kan bota eventuella infektioner som ännu inte har upptäckts och förhindra att skabb sprids eller leder till en ny infektion.

3. Hur du använder Scaderm 250 mg/g

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Scaderm 250 mg/g är avsett för användning hos vuxna och ungdomar från 12 år.

Rekommenderad dos är:
Applicera emulsionen på huden en gång dagligen under tre dagar i rad.

Avsluta därefter behandlingen, även om klådan kvarstår.

- Innan du påbörjar behandlingen ska du tvätta kroppen noggrant (bad eller dusch) och vid behov klippa naglarna. Du kan också duscha innan du applicerar emulsionen de kommande två dagarna. Scaderm 250 mg/g får endast appliceras på helt torr hud och när kroppstemperaturen har återgått till det normala, dvs. cirka 60 minuter efter dusch.
- Gnid in Scaderm 250 mg/g noggrant över hela kroppen, från halsen till tårna, under 3 dagar i rad. Applicera emulsionen i ett tunt lager och sprid ut det jämnt, precis som med solkräm. Det ska gå cirka 24 timmar mellan appliceringarna.
- Behandla synliga, drabbade områden på huden extra noggrant. Gnid noggrant in varje finger, varje tå och områdena mellan dem, alla kroppsveck, bröstkorgen, yttre könsorgan (inte slemhinnorna), området runt midjan och skinkorna. Dessa är områden som skabbkvalster gillar.
- Om läkaren har sagt att du också ska applicera Scaderm 250 mg/g på huvudet måste du säkerställa att du noggrant undviker områden runt ögonen, munnen och näsan.
- Om du tvättar händerna under dagen, måste du applicera emulsionen direkt efteråt igen.
- På den 4:e dagen ska du duscha eller bada för att tvätta bort läkemedlet noggrant från huden.
- Byt alla dina kläder (underkläder och ytterkläder) och sängkläder dagligen under behandlingen. Byt dessutom allt på dag fyra.

Hur länge kan du använda Scaderm 250 mg/g?
Produkten används under tre dagar i rad.
Använd inte Scaderm 250 mg/g i mer än 3 dagar om inte din läkare har rekommenderat dig att göra det. Om klådan kvarstår efter behandlingen är det viktigt att du kontaktar läkare. Det kan vara nödvändigt med ytterligare behandling.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du upplever att behandlingen med Scaderm 250 mg/g är för stark eller för svag.

Om du har använt för stor mängd av SCADERM 250 mg/g
Ta bort överskottet från huden med en duk. Överdoser är inte kända.
Om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Scaderm 250 mg/g
Använd inte läkemedlet två gånger nästa dag och ta inte heller dubbla mängden, utan fortsätt behandlingen så att den totalt pågår i tre dagar.

Om du slutar att använda Scaderm 250 mg/g
Skabbkvalster förblir livskraftiga och de ursprungliga symtomen återkommer.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Behandling av textilier och föremål
Det är viktigt att även rengöra omkringliggande områden för att så långt det är möjligt förhindra en ny infektion. Skabbkvalster kan dödas vid temperaturer över 50 °C eller vid avsaknad av luft.
Således ska sängkläder, underkläder, handdukar och ytterkläder tvättas vid en temperatur på minst 60 °C. Detta gäller även andra föremål som man har haft långvarig fysisk kontakt med, såsom gosedjur, blodtrycksmanschetter och skor. Föremål och kläder som bara får tvättas vid lägre temperaturer eller inte alls ska förvaras i en försluten plastpåse under sju dagar.
Mattor, madrasser och stoppade möbler ska dammsugas noggrant.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): irritation på huden och på slemhinnorna.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): ihållande klåda.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
- Överkänslighetsreaktioner som visar sig som sjukdomskänsla nässelfeber (urtikaria) och kärlödem (angioödem) samt beröringskänsliga, inflammatoriska hudreaktioner (kontakteksem)
- Epileptiska anfall hos barn

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Scaderm 250 mg/g ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

När flaskan har öppnats ska emulsionen användas inom 3 veckor men inte efter utgångsdatum.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet (t.ex. i toaletten eller handfatet). Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är bensylbensoat. 1 g emulsion innehåller 250 mg bensylbensoat. Övriga innehållsämnen är emulgerande cetostearylalkohol (typ A), propylenglykol (E 1520), renat vatten, sorbitol, flytande (icke-kristalliserande).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit kutan emulsion i en brun glasflaska förpackad i en kartong. Det finns en förpackningsstorlek med 200 g emulsion.

Innehavare av godkännande för försäljning
Strathmann GmbH & Co. KG
Langenhorner Chaussee 602
22419 Hamburg
Tyskland

Tillverkare
mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast: 21.05.2026